

RS Sugawara, Toshiyasu
180 Honzo tsukan
J3S8
1937
v.10

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

問 顧

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村 出先生

正宗敦夫

編纂
校訂

本草通串


自三十九卷
至四十二卷

合資
會社


日本古典全
集刊行會壽梓

長鳴豐太郎精刻

RS
180
J388
1937
v.10



本草通串卷三十九



富山侍從兼長門守管原朝臣利保纂輯

山草

胡黃連

胡牛頤坐也从肉古聲戶孤切說文

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢
益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人

五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊
花玄參白前皮解已豆毒服之忌猪肉令人漏精以
人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之肉
似鸚鵡眼者良

唐本草○
大觀本草

集解恭曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯
草根頭似鳥嘴折之內似鸚鵡眼者良八月上旬采
之氣味恭曰大寒惡菊花玄參白鮮皮解已豆毒忌
猪肉令人漏精**主治**補肝膽明目治骨蒸勞熱三消
五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷洩痢五痔厚腸胃益顏

色浸人乳汁點目甚良

蘇唐本草○
恭本草綱目

胡牛領垂也從肉古聲臣鍇曰牛領下垂皮也言宛

曲也又人言漫胡者謂漫裏其宛曲無稜利也又謂

北狄爲胡亦然也魂徒反

說文解
字通釋

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧骨

熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢

生胡國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤

今開寶
附本草

○大觀
本草

治久痔成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒

欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗

開寶本草○
本草綱目

胡黃連味苦平無毒主久痢成疳小兒驚癇寒熱不

下食溫瘧骨蒸

開寶本草○
吳懷祖輯要

別說云謹按胡黃連折之塵出如煙者爲真

陳承本
草別說

○大觀
本草

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間又有之初
生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今
小兒藥中多用之又治傷寒勞傷身熱大小便赤如
血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌

和炒令微焦二味搗羅爲末用猪腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一个童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令温下十丸臨卧再服甚効

圖經○大觀本草

集解

頌曰今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾則

似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收采折之塵出如

煙者乃爲真也

圖經○本草綱目

廣州胡黃連

味苦平無毒備急本草圖按

胡黃連似黃連而心黑一名割孤露澤

昆蟲草水畧

本草綱目
主治 去果子積 震亨朱震亨 ○

○又種生羗胡國土因以胡黃連爲名乾如楊柳枯

枝折斷一線煙出氣平寒味尤苦甚心內黑皮畧淡

黃惡玄參菊花亦解巴豆毒忌猪肉悞食令人洩精

療癆熱骨蒸治傷寒欬嗽溫瘧多熱卽解久痢成疳

竟除補肝膽却目痛尤靈理腰腎斂陰汗最捷小兒

盜汗潮熱婦人胎蒸虛驚並宜用之不可缺也 本草蒙筌

胡黃連味苦氣寒無毒入手足太陰足陽明足厥陰

經沉也降也 蘇氏曰出波斯國及海南陸地今秦隴

間亦有之初生苗若夏秋草又如蘆乾

則似楊柳枯枝根頭似鳥觜折之內黑外黃○胡黃
似鸛鵒眼塵出如煙者良不拘時月收采

連退肝脾伏熱濕熱之藥也此劑大寒至苦極清之
性能清熱自腸胃以及于骨一切濕火邪熱陰分伏
熱所生諸病莫不消除故陳氏方化五痔截溫瘡解
熱痢清黃疸退骨蒸明目疾定驚癇寒熱治小兒久
痢成疳皆取苦以洩之寒以散之之意云○繆仲淳
先生曰胡黃連氣味苦寒之至設使陰血大虛真精
耗竭而胃氣脾陰俱弱者雖見如上諸證亦勿輕投
卽欲用之亦須與健脾養胃等藥同用乃可○沉則

施先生曰胡黃連統治小兒熱疳熱勞一切虛羸怪

異熱病

本草
彙言

胡黃連乾如楊柳枯枝心黑皮黃折之有一線煙出

因生胡國形類黃連故以為名味苦平無毒主久痢
成疳傷寒咳嗽溫瘧

骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱霍亂
亂下痢婦人胎蒸虛驚並宜服之即効本草

胡黃連釋名割狐露澤時珍曰其性味功用似黃連

故名割狐露澤胡語也氣味苦平無毒本草
綱目

附錄

胡黃連

生波斯國海畔陸地今南海秦隴間亦
有之初生似蘆苗若夏枯草根頭似鳥

觜乾則似楊柳枯枝心黑外黃折之內似鸛鵒眼塵
出如烟者良八月上旬採苦平無毒治骨蒸勞熱三

消五心煩熱婦人胎蒸虛驚羣芳
冷熱洩痢厚腸胃益顏色

譜

胡黃連 苦寒去心熱益肝胆厚腸胃治骨蒸勞熱

五心煩熱

心窩手

三消

渴而多飲為上消肺熱也心
移熱下肺傳為鬲消是也多

食善飢為中消胃熱也痺或為中消足也五痔壯痔

渴而小便數有膏為下消腎熱而水虧也
脉痔腸痔血痔濕熱下流傷血分
無所施洩則逼肛門而為痔腫
溫瘡瀉痢女人胎

蒸消菓子積為小兒驚癇良藥

朱二允曰解吃烟性
毒合茶服之甚効

味功用似黃連故名出波斯國今秦隴南海亦有之

心黑外黃折之塵出烟者真畏惡同黃連

本草
備要

胡黃連禀天地清肅陰寒之氣蘇頌主骨蒸勞熱補

肝膽明目冷熱泄痢厚腸胃三消五痔爲清溼熱邪
熱陰分伏熱所生諸病也 同川黃連等分爲末用
黃瓜一箇去瓢留蓋入藥在內合定麪裏煨熟去麪
搗丸菜豆大量服溫水下治小兒黃疸 性味苦寒
之至設使陰血大虛真精耗竭而胃氣脾陰俱弱切
勿輕投卽欲用之須與健脾胃等藥同用乃可無弊

慎之

本草經
疏輯要

胡洪吾切音乎喉也頷肉下垂者曰胡○說文篆作

胡舉要篆作厓別作怕𣎵非

正字
通

割孤露澤 本草綱目胡黃連性味功用似黃連胡

名割孤露澤胡語也

事物異名錄

胡模濁 洪孤切音乎牛領下縣肉也

字彙

原胡黃連一名割孤露澤

本草綱目云其性味功用似黃連故名割孤露澤

語也 生波斯國海畔陸地今南海秦隴間亦有之初生

似蘆苗若夏枯草根頭似鳥嘴乾則似楊柳枯枝心

黑外黃折之內似鸛鵒眼塵出如煙者良八月上旬

採氣味苦平無毒治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人

胎蒸虛驚冷熱洩痢厚腸胃益顏色

廣羣芳譜

黄連

一種葉如竹
泉州府志

胡唐韻戶孤切集韻韻會正韻𠀤音瑚說文牛領垂

也正字通喉也領肉垂者曰胡典字

胡黃連和名未詳異名割孤露澤多識編

胡黃連苦大寒外黃心黑乾如楊柳枯枝折之塵出

者乃爲真也惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒忌猪肉

令人漏精當藥草人或用充胡黃連非是本草喉襟

胡黃連黃連二似テ大也黃ナラズ味苦シ蘆頭

毛黃連二似タリ中華ヨリ來ル此草日本ニアリ

ヤ未詳千振トテ秋白花ヲ開キテ葉細ニ味甚苦

キ小草山野ニアリ又タウヤクト云國俗是ヲ好

テ用之殺蟲消積コレヲ胡黃連ト云非ナリ或曰

倭方ニ胡黃連トカケルハ皆センフリヲ用ユベ

シト云

大和本草

胡黃連 割孤露澤 本綱胡黃連出波斯國生海

畔陸地今南方亦有之其性味功用似黃連初生似

蘆乾則似楊柳枯枝心黑外黃折之塵出如煙者乃

爲真其根頭似鳥嘴折之内似鸚鵡眼者良氣味

寒苦

主傷寒咳嗽發熱大小便赤如血補肝膽明目理腰

腎主兒疳痢鎮癰驚

惡菊
花玄參
白鮮皮
解巴豆
毒忌猪
肉令人
漏精

△按

倭用當藥充胡黃連形狀大異不可以類也故令禁

稱胡黃連○當藥 正字未詳 俗云世牟不利△

按當藥播州三水郡多之苗高五六寸一松數莖其

莖細而淡紫色葉似地膚草而小七月開花形似桔

梗花小色黃有無花者根長黃色氣味

大苦
寒倭方丸

散諸蟲積聚藥入用或有代胡黃連用之者不可今

人用染兒衫衣黃色云能避蚤虱

和漢三
才圖會

胡黃連釋名出胡地時珍曰其性味功用似黃連修

治劉少灸用日本從古以當藥草值之氣味形狀大
異中華產心黑外黃折之塵出如烟者良蓋日本所
製作之藥方稱胡黃連者當用當藥歟氣味平無毒
能補肝膽明目治骨蒸勞熱五心煩熱婦人胎蒸虛
驚冷熱洩痢五痔小兒久痢爲疳驚癇寒熱毒惡菊
花玄參中氣不足者忌之凡眼疾本於肝膽肝與心
爲子母心火也肝亦火也腎孤藏也人患一水不勝
二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其

ス旦並書一

可乎○

修治

松岡氏云和ノ當藥モナルホド胡黃

連ナリ草ノ形違ヘ氏ソレハ土地ニ因リテ變ル

トアリ稻先生ハ別物ナリ不可用ト云ハル、本

書ト同意ナリ然レバ本書ヲ佳^{ヨシ}トスベシ能^{ヨシ}本書

ノ如シ予云コノ藥外ノ一ニ用ル一ハナイ小兒

ノ疳ノ藥ニ入ル斗^{ガリ}ナリ常ノ黃連ヨリハ苦三ツ

ヨクノ難^レ用藥ナリ

片玉六
八本草

胡黃連 和漢共ニ可通用漢ハ氣味和ス和ハ烈

ナリ和名センフリ又當藥ト名ク和産與漢渡者

形ノ異ナルヲ以テ疑フ人アリ其實ハ同種ナリ
タゞ土地ノ異ニヨツテ和ト烈トノカワリアリ
ト稻若水云ヘリ蒼朮漢和有異例ノ如シ用藥須知

胡黃連 鸛鵒未詳ク口ツクミ本草會誌

重康曰播州三水郡ニ當藥ヲ多ク出ス苗ノ高サ
五六寸莖細クシテ淡紫色葉ハ帚萼ノ葉ニ似テ
小ク六七月花ヲ開ク形桔梗ニ似テ小ク色黄ナ
リ又花ナキモノアリ根細長ク黄色ナリ○先生
按スルニ此草東國所々ニ産ス一名千振草トモ

云稻若水是ヲ胡黃連トス中土ヨリ來ルハ味ヒ
柔ニ和産ハ味ヒ烈シキ故ニ別種ナリト云人ア
レ氏其實ハ同種ナルヨシ松岡氏モ云ヘリ東國
ニ生スルハ白花ノモノガ多シ或曰此當藥ハ本
草彙言ニ載スル所ノ石龍膽ノ種類ナルベシ和
邦ノ虫藥等ニハ用ユベシ小兒ノ方ニハ中土ヨ
リ來ルヲ用ベシトイヘリ

採藥
使記

午振草シ一名當藥生山野高五六寸葉似龍膽八
九月開花白及淡紫色花葉味甚苦能治諸虫止腹

痛播州三水郡多有之一種有無花者根細長黃色

也

和俗稱和胡黃連

物品
目錄

胡黃連

和名クサレダマ昔ヨリ當藥ヲ胡黃連

トス誤ナリ唐本草折之内似鸛鴒眼者良トスト

ウヤクニ眼ナクモトヨリ肉モナシクサレダマ

ナルトキハ中土産ト異コトナシ當藥ハ延年府

志所謂斜枝菜ナリ功用亦格別ナルモノ血痢不

止者生胡黃連烏梅大黃三味水煎溫服立止見奇

良方又水ノレダマト云モノアリ鷹爪花ト云モノ

ノナリ草レダマトハ大キニ違タルモノナリ混
ズベカラズ 廣大和本草

胡黃連 和産ナシ 藥舗ニ舶來アリ根ノ形地黄

ニ似テ長サ二三寸徑リ二三分許外ハ黃白色ニ

ノ疣瘡アリ肉ハ紫黑色ニシテ五ノ白點アリテ

梅花瓣ノ如ク並ベリ本草原始ニ肉黒有白點類

梅花外淡黄色ト云是也味苦シ故ニ古ヨリセ

ンフリ一名トウヤクニ充來レ氏誤也トウヤク

ハ獐牙菜ノ種類ニモ小草也根形毛大ニ異リ然

レ氏和ノ方書ニ胡黃連ト書來ルハ皆トウヤク
ヲ用ベシ唐山ノ書ニ胡黃連ト書スルハ舶來ノ
者ヲ用ベシ **集解**ニ鸛鶴ハ 八八鳥ノフナリ
或ハヒヨドリ或ハクロツムギ等ニ充ルハ誤ナ

リ 本草
啓蒙

當藥 和ノ胡黃連也センフリ 藥品手
引草

胡黃連 漢渡可用古來和産ノ胡黃連ハセンフ
リヲ云貝原氏センフリヲ胡黃連ト云ハ非ナリ
トシ倭方ニ胡黃連トカケルハ著センフリヲ用

ヌベシト此説甚佳ナリ松岡氏ハ和漢共ニ可通
 用漢ハ氣味和ス倭ハ烈シ和名センフリ又タウ
 ヤクト名ツク和産與漢渡者形ノ異ナルヲ以テ
 疑フスアリ其實ハ同種ナリト云云愚案スルニ
 漢渡ハ根形黃連ニ似テ肥大地黃ニ似テ堅實ナ
 リセンフリハ小草莖葉ハ遠志ニ似テ秋白花ヲ
 開キ細根鬚ノ如シ其味苦ク殺蟲_レ若是ヲ以テ胡
 黃連ニ代用ユト云ハ可ナリ同種トスルハ鹵莽
 ノ説ナリ

本草
正譌

胡黃連

一名割孤露澤

通志本草
畧 穿要

アケボノサウ

獐牙菜
救荒

センフリ

獐牙菜一種
本草
タウヤク

藥名備考
和訓鈔

獐牙菜

和名アケボノサウ

サワホト、ギス

太田油點草ト
同名異物也

播州深山溪澗水傍ニ生ス武州道

灌山中里邊ノ水地ニアリ初生

或ハ車前苗ニ

似リ葉紫萼ニ似テ短ク厚ノ深綠色光澤アリ堅

二三縱道アリコ、ニ龍鬚菜葉牛尾菜葉ニ似リ

ト云モ三條脉アルヲ云ナリ深秋圓莖對生シ

高廿三四尺梢ニ短枝ヲ分チテ花アリ形セニフ
リニ似テ大也五瓣白色瓣ゴトニ細黒點アリ大
サ四五分後莢ヲ結フ綠色ニノ形連翹角ニ似リ
熟スレバ頭自ラ裂ル中ニ細黒子アリ葉味微苦
コ、ニ甜シト云ヘ氏疑ベカラズ決テアケボノ

サウ也
救荒本草通解

獐牙菜 澤ホト、ギス アケボノ草上方 救荒

本草ニ生水邊ト云葉車前ニ似初苗布地生夏抽
莖水黃色ノ花ヲ開花中紫点アリ林下陰濕ノ地

ニ生ス田村氏ハ本條ヲ竹葉ト云太田氏ハ誤也
ト云按ニ竹葉柴胡不的紅毛ノ畫本ウエイニ
ニ圖アリセシフリトナラベ畫ス或云甚苦シ當
藥ノ一類ト云然ヤ否 太田氏牛扁ノ附録虱建
草ヲ澤ホト、ギスト云 深山ヲモダカ 山草
也葉水アフヒノハニ似テ甚小二高サ二三寸タ
テニ皺アリ春小白花ヲ簇生ス可愛也藥王草カ
ト云 工區別 百花天

樟牙菜救荒ホタル草 同名
アリ

コノ草溪水ノ邊リニ

生ズ春初生ノ葉ハ地ニ就テ葉數アツマリ生ジ
テ車前ノ葉ニ似テ縦ニ筋アリテ少セマクウス
クヤワラカナル葉ナリ夏葶ヲ抽テ莖丸シ秋ニ
至テ高サ二三尺ニナル莖ノ葉ハセマク葉ノ間
ゴトニ枝ヲ對生シソノ上ニ小枝ヲワカチテ五
ベンノ白花ヲヒラクトガリテ黃色ノ点アリア
トニ實ヲ結フ長サ一分バカリニシテ是モ又先
トガレリ大葉ノ柴胡ニモホタル草ノ名アリ混

ズベカラズ

四季賞
花集

胡黃連 唯從舶上來已假雜無有新故宜審云是

折之塵出如煙者乃爲真也前醫或以爲千振草非

也然其効用略相近

本草綱目纂疏

獐牙菜

汝南圖志

アケボノサウ
カノコサウ

多識正名

胡黃連

增集解

蘇頌ノ説ニ折之塵出如煙者乃

爲真ト云ハ誤ナリ新シキ者ハコレヲ折レハ黑

質白斑梅花瓣ノ如ク甚鮮明ナリ古クシテ乾枯

スル者ハ煙ノ如キ塵ノ出ルヲアリ センフリ

一名トウヤクハ氣味形狀共ニ龍膽ノ品類ナリ

獐牙菜ノ種類ニハアラズ重修本草啓蒙

コワウレン 胡黃連和產物品未詳識名

胡黃連 根舶來一品真ナリ 和產ナシ藥舗ニ和

ノ胡黃連ト稱シ售モノハトウヤク一名セニフ

リト云モノニ漢名詳ナラザル者ナリ日用藥品考

獐牙菜 ホタルサウ アケボノサウ 水邊澤

地ニ生ス葉形車前葉ニ似テ長ク三縱紋アリ地

ニ就テ叢生ス少シ臭氣アリ年ヲ經テ莖ヲ抽ク

高サ三四尺節アリ黑色ヲ帶ブ葉對生シ葉間ニ

小枝ヲ分チ秋月白花ヲ開ク大サ錢ノ如シ五瓣
淡黄ニシテ青色ヲ帶タル小點アリテ螢火ニ似
タリ故ニホタルサウト云花ノ中心ヨリ長ク尖
リタル莢吐出ス長サ三四分青色ニシテ細目ノ
筋アリテ梅葉ノ如シ内ニ實アリ霜後枯ル
救荒本草

啓蒙

胡黃連 古方ニテ胡黃連ト云モノハ此物ナリ

和方書ニ胡黃連トアルハトウヤクニノ獐牙菜

ノ一種ナリ

手板發蒙

一

一

一

一

胡黃連

一

本草通串卷三十九

本草通串卷四十

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

黃芩

黃芩味苦平無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血

閉惡瘡疽蝕火瘍一名腐腸

神農本草經
大觀本草○

本草經曰黃芩一名腐腸味苦平生川谷治諸熱

神農

本經○太平御覽

黃芩

本經中品

釋名腐腸

本經

主治

諸熱黃疸腸澼洩痢逐

水下血閉惡瘡疽蝕火瘍

本經

神農本草綱目

○

本草云主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽

蝕火傷

神農本草綱目

黃芩味苦平主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡

瘡疽蝕火瘍

腐腸

神農本草綱目

黃芩味苦平無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血

閉惡瘡疽蝕火瘍

神農本草綱目

○吳懷祖輯要

黃芩味苦平主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡

瘡疽蝕火瘍

神農本草經
○百種錄

黃芩味苦平主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下血閉惡

瘡疽蝕火瘍一名腐腸

神農本草經
○增補庶物類纂

黃芩大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小

腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名空腸一名內

虛一名黃文一名經芩其子主腸澼膿血生枌歸川

谷及寃旬三月三日採根陰乾

名醫別錄
大觀本草

黃芩釋名空腸

別錄

內虛

別錄

黃文

別錄

集解

曰黃芩生枹歸川谷及宛句三月三日采根陰乾根

氣味別錄曰大寒主治療痰熱胃中熱小腹絞痛消

穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛別子主治

腸澼膿血別名醫別錄本草綱目

本草云療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子

血閉淋露下血小兒腹痛名醫別錄湯液本草

黃芩大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小

腸女子血閉淋露下血小兒腹痛名醫別錄神農本草經疏輯要

黃芩大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小

腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名空腸一名內
虛一名黃文一名經苓其子主腸澼膿血生和歸川
谷及寃句三月三日採根陰乾梁陶弘景名醫別錄
○增補庶物類纂

葢黃葢也从艸金聲巨今切

說文

食野之苓巨今切

說文

說文曰葢黃苓也

說文

○太
平御覽

陶隱居云种歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有
之圓者名子苓爲勝破者名宿苓其腹中皆爛故名
腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須神農

本草陶弘景註
○大觀本草

釋名內實者名子苓

弘景

曰圓者名子苓破者名

宿苓其腹中皆爛故名

集解

弘景曰種歸屬建平郡

今第一出彭城鬱州亦有之惟深色堅實者好俗方

多用道家不須

神農本草陶弘景註
○本草綱目

吳普本草云黃苓又名印頭一名內虛二月生赤黃

葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫

紅赤五月實黑根黃二月九月採

吳普本草
○大觀本草

吳氏本草曰黃苓一名黃文一名妬婦一名虹勝一

名經芩一名印頭一名內虛神農桐君黃帝雷公扁
鵲苦無毒李氏小溫二月生赤黃葉兩兩四四相值
莖空中或方負高三四尺四月花紫紅赤五月實黑
根黃二月至九月採

吳普本草
太平御覽

黃芩

釋名

妬婦

吳普印頭

吳普

集解

吳普本草云二月生

赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺

四月花紫紅赤五月實黑根黃二月至九月采

吳普
本草

○本草
綱目

芩藎黃文內虛黃芩也

雅

廣雅曰妩眉黃文内虛黃芩也

廣雅〇太平御覽

范子計然曰黃芩出三輔色黃者善

范子計然〇同上

得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子

得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡

葱實畏丹砂牡丹藜蘆

徐之才藥對〇大觀本草

根氣味

之才曰山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂

牡丹藜蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人

有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻

藥對〇本草綱目

本草又云得厚朴黃連治腹痛得五味子牡蒙牡蠣

令人有子得黃芪白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨

爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

藥對○湯液本草

藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來

腸胃不利破擁氣治淋令人宣暢去關節煩悶解熱

渴治熱腹中疴痛心腹堅脹

藥性論○大觀本草

主治治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五

淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴

甄藥性論○權本草綱目

黃芩一名妬婦花

駢香儷豔

千金翼云治淋黃芩四兩袋貯之水五升煮三升分

三服

千金翼方
大觀本草

○

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水
下血閉惡瘡疽蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹痛消
穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸
一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦
其子主腸澼膿血生神歸川谷及冤句三月三日採
根陰乾

千金
翼方

唐本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今
出宣州鄆州涇州者佳兗州者大實亦好名狔尾芩

也唐本注
大觀本草

釋名 狝尾苓唐本 集解 恭曰今出宜州鄜州涇州者佳

兗州者大實亦好名狝尾苓唐本注
本草綱目

臣禹錫等謹按藥性論云黃芩臣味苦甘能治熱毒

骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢

去關節煩悶解熱渴治熱腹中疔痛心腹堅脹蜀本草

禹錫按大觀本草

黃芩 伎佐乃水新撰

黃芩仁諧音 一名腐腹其腹中皆爛 一名空腸 一名

黃芩

內虛一名黃久一名經岑揚玄操音一名妬婦一名

子苓負一名宿苓破者一名狔尾苓出蘇敬注一名虹勝一

名經苓一名媚眉一名印頭出釋藥性一名青麴一名北

節已上出華佗方和名比々良岐一名波比之波本草和名

葦黃葦也從艸金聲臣錯按本草葉細長兩葉相對

作叢生藥草也却林反**葦**草也從艸今聲詩曰食野

之苓臣任反說文解字通釋

遠江國黃芩十斤○近江國黃芩七斤○美濃國黃

芩十四斤○上野國黃芩十斤○讚岐國黃芩七十

三斤五兩延喜式

日華子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

日華本草○
大觀本草

主治下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背大日明華

子大明○
本草綱目

圖經曰黃芩生神歸山谷及宛句今川蜀河東陝西
近郡皆有之苗長尺餘莖榦窺如筋葉從地四面作
叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩
兩相對六月開紫花根黃如知母窺細長四五寸二

月八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭
一名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中
或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九
月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心
湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽
病下之利不止有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎
散亦多用黃芩今醫家嘗用有効者因著之又千金
方已郡太守奏加減三黃丸療男子五勞七傷消渴
不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩

大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃
連七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三
月黃芩三兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸大
如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一月病
愈久服走及奔馬近頻有驗食禁豬肉又陶隱居云
黃芩圓名子芩仲景治雜病方多用之

圖經○大
觀本草

集解 頌曰今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘
莖幹粗如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許
亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根

如知母粗細長四五寸二月八月米根暴乾吳普本
草云二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方
圓高三四尺四月花紫紅赤五月實黑根黃二月至
九月米與今所說有小異也發明頌曰張仲景治傷
寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱
利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有
葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用之附方
三黃丸孫思邈千金方云巴郡太守奏加減三黃丸
療男子五癆七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒

熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩
夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩
六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五
兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸烏豆大米飲
每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈久服走
及奔馬久用有驗禁食豬肉

圖經○本草綱目

張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用黃芩以
其去諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛
根黃芩黃連湯亦主妊娠安胎散內多用黃芩今醫

本草通串

家常用有效者因著之千金方巴郡太守奏加減三
黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手
足寒熱者久服得行及奔馬甚驗圖經本草
湯液本草○

耀州黃芩

潞州黃芩

三月三日備急本
揀根陰乾草圖按

潔古云利胃中氣消膈上痰性苦寒下痢膿血稠粘
腹疼後重身熱久不可者與芍藥甘草同用

珍云除

陽有餘涼心去熱通寒格陰中微陽酒炒上行主上

部積血非此不能除肺苦氣上逆急食苦以泄之

張元

素珍珠囊○
湯液本草

根氣味

元素曰氣涼味苦甘氣厚味薄浮而升陽中

陰也入手少陽陽明經酒炒則上行主治涼心治肺

中濕熱瀉肺火上逆療上熱目中腫赤瘀血壅盛上

部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽

元素

發明元素曰

黃芩之用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二

也去諸熱三也利胸中氣四也消痰膈五也除脾經

諸濕六也夏月須用七也婦人產後養陰退陽八也

安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能除下痢

膿而腹痛後重身熱久不能止者與芍藥甘草同用

之凡諸瘡痛不可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分

身稍及引經藥用之

張元素
本草綱目

象云治肺中濕熱療上熱目中赤腫瘰癧肉盛必用之

藥泄肺受火邪上逆於膈上補膀胱之寒不足乃滋

其化源也心云瀉肺中之火東垣云味苦而薄中枯

而飄故能泄肺火而解肌熱手太陰劑也細實而中

不空者治下部妙

李東垣藥類法
象○湯液本草

根氣味

杲曰可升可降陰也

發明

杲曰黃芩之中枯

而飄者瀉肺火利氣消痰除風熱清肌表之熱細實

而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源
高下之分與枳實枳殼同例

李杲○本草綱目

黃芩解熱通淋女子崩因熱者**黃芩**味苦平大寒無
毒治熱黃疸止痢女子血崩本性熱者良虛寒者不
可用**黃芩**味苦平性寒無毒可升可降陰也其用有
四中枯而飄者瀉肺火消痰利氣細實而堅者瀉大
腸火養陰退陽中枯而飄者除風濕留熱於肌表細
實而堅者滋化源退熱於膀胱○下焦濕熱用**黃芩**
○凡藥有畏惡相反所謂惡其異我不得自盡如生

本草通串
 薑惡黃芩之類是也○黃芩治諸熱兼主五淋李杲藥性

賦

發明 震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦濕熱

須以酒洗過用片黃瀉肺火須用桑白皮佐之若肺

虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺氣而後用

之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩爲寒而不敢用

蓋不知胎孕宜清熱涼血血不妄行乃能養胎黃芩

乃上中二焦藥能降火下行白朮能補脾也○朱震亨本草

綱目

黃芩氣寒味微苦苦而甘微寒味薄氣厚陽中陰也

陰中微陽大寒無毒

湯液本草

根氣味

好古曰氣寒味微苦而甘陰中微陽入手太

陰血分

王好古○本草綱目

發明

羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臭

入肺爲腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉

中腥臭

羅天益衛生寶鑑○本草綱目

釋名

苦督郵

記本草綱目

苦督郵

黃芩錄耕

苦督郵黃芩也

清異錄侯寧極藥譜

黃芩味苦氣平大寒味薄氣厚可升可降陰也陰中微陽無毒所產尚彭城凡用擇深色剔去內朽刮淨外衣薄片咀成生炒如式單惡蔥實勿令同煎畏丹砂牡丹藜蘆川山茱龍骨引使枯飄者名宿芩入手太陰上膈酒炒爲宜堅實者名子芩入手陽明下焦生用最妙宿芩瀉肺火消痰利氣更除濕熱不留積於肌表間子芩瀉大腸火養陰退陽又滋化源常充溢於膀胱肉赤刺頻併可止赤眼脹痛能消得

五味蒙蠣

五味子牡蠣

育妊娠得白朮砂仁安胎孕瘵

鼠瘻同耆欬赤豆

黃耆白欬赤小豆

治腹疼同厚朴黃連又

煎小清空膏

載丹溪方

單味而清頭腦總除諸熱收盡全

功子

研細煎湯治腸辟膿血

本草蒙筌

黃芩味苦平性寒無毒入肺大腸膀胱膽四經主崩

淋熱疽痛痢惡瘡解毒收口去翳明目調經安胎中

枯而飄者瀉肺火消痰利氣除風濕惡熱於肌表細

實而堅者瀉大腸火養陰退陽滋化源除熱膀胱山

茱萸龍骨爲使惡蔥實畏丹砂牡丹藜蘆砂參丹參

按苓枯飄者有上升之象故入肺堅實者有下行之理故入大腸諸經性甚寒苟無實火不宜用之

補藥

雷公炮製
藥性解

釋名鼠尾苓時珍曰苓說文作荃謂其色黃也或云

苓者黔也黔乃黃黑之色也宿苓乃舊根多中空外黃內黑卽今所謂片苓故有腐腸妬婦諸名妬婦心黯故以比之子苓乃新根多內實卽今所謂條苓或云西苓多中空而色黔北苓多內實而深黃根氣味時珍曰得酒上行得豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒

熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎主

治風熱濕熱頭痛奔豚熱痛火欬肺痿喉腥諸失

血時珍發明時珍曰潔古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕

東垣李氏言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏

言黃芩治上中二焦火而張仲景治少陽證小柴胡

湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下復心下滿

而不痛瀉心湯並用之成無已言黃芩苦而入心泄

痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足大陰少陽六經

矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心

火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺
卽所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也
少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩嘔或
否或小便不利雖曰病在半表半裏而胸脇痞滿實
兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼脾胃
中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少
陽本經藥也成無已注傷寒論但云柴胡黃芩之苦
以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊
昧其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃

芩薤亦不知柴胡之退熱乃若以發之散火之標也
黃芩之退熱乃寒能勝熱折火之本也仲景又云少
陽證腹中痛者去黃芩加芍藥心下悸小便不利者
去黃芩加茯苓似與別錄治小腹絞痛利小腸之文
不合成氏言黃芩寒中若能堅腎故去之蓋亦不然
至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹
中痛及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無
熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不
利者黃芩其可不用乎故善觀書者先求之理毋徒

泥其文昔有人素多酒慾病小腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便闕服芩連藥而愈此皆熱厥之痛也學者其可拘乎予年二十時因感冒欬嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盜汗暑煩渴寢食幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先君偶思李東垣治肺熱如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按

方用片苓一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鼓應桴醫中之妙有如此

哉

本草綱目

黃芩味苦氣寒無毒味薄氣厚可升可降陰中陽也

入手太陰少陰太陽陽明及足少陽經

陶隱居曰黃芩生建平郡

及宛句山谷彭城鬱州及宣州劇州涇州今川蜀河東陝西諸郡亦有俱二月生苗長尺餘莖幹粗如筍中空外方葉色黃赤從地四面叢生五月開花花色紫實色黑根色黃根圓者名子苓曰條苓即小根之內實者根破者名宿苓即大根之內虛者其葉細長而青故有腐腸妬婦諸名又一種獨莖者其葉細長而青根如知母粗細長四五寸八月采根暴乾又云西苓多中空而色黯北苓多內實而深黃兗州一種大而

實者名狝
尾芩亦妙

○黃芩清理三焦消痰降火之藥也凡病
痰咳火嗽喘急氣盛或黃疸濕熱骨節煩疼或小便
赤濁小腹急疾或熱毒骨蒸寒熱虛勞或痢疾赤白
大便後重或天行疾熱目痛腫赤六者非黃芩不能
治又曰清肌退熱柴胡最佳然無黃芩不能涼肌達
表上焦之火山旆可降然舍黃芩不能上清頭目本
草云氣清而親上味重而降下此劑味雖苦寒而有
泄下之理體質枯飄而有升上之情故善能治三焦
之火者也所以方脉科以之清肌退熱瘡瘍科以之

解毒生肌光明科以之散熱明目婦女科以之安胎
理經此蓋諸科半表半裏之首劑也 王少字先生
曰按黃芩其性清肅可以除邪其味苦可以燥濕其
氣寒可以勝熱故能瀉心火泄痞熱則邪火不流入
肺而金不受刑卽所以救肺也傷寒少陽證寒熱胸
脇痞滿心煩嘔或渴或小便不利雖曰病在半表半
裏而係心肺上焦之邪又兼脾胃中焦之證故用黃
芩亦少陽本經藥也前人云柴胡退熱不及黃芩不
知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退

熱乃寒以勝熱折火之本也別錄謂黃芩治小腹絞
痛而利小腸然仲景又云腹中痛者去黃芩加芍藥
心下悸小便不利者去黃芩加茯苓似乎相反蓋亦
有說也若因飲食受寒腹中痛及飲水多心下悸小
便不利者是裏無熱證黃芩不可用也若熱厥腹痛
肺熱而小便不利者黃芩可不用乎 高元陽先生
曰黃芩苦能燥濕苦能泄熱苦能下氣如中枯而輕
飄者主上行清肺部而止咳化痰并理目赤痘癰細
實而堅者下降清大腸而除濕治痢兼可安胎利濁

二用少有別也 李時珍先生曰黃芩入小柴胡湯

治傷寒寒熱邪在少陽亦治少陽瘧往來寒熱傷寒

心下諸痞滿證用諸瀉心湯

傷寒心下滿而鞭痛者為結胸宜陷胸湯心下

滿而不鞭痛者為痞用半夏瀉心湯傷寒心下痞而復惡寒汗出者用附子瀉心湯傷寒汗出解之後心

下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者用生薑瀉心湯傷寒中風醫反下之下利日數十行腹

中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩用甘草瀉心湯

皆用黃芩以主諸熱利小

腸故也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根

黃芩黃連湯又太陽少陽合病下利黃芩湯若嘔者

黃芩加半夏生薑湯成氏言黃芩苦而入心泄痞熱

清心火去脾濕也諸方故多用之 繆仲淳先生曰

苦寒爲苦寒清肅之藥功在除熱邪利痰氣然苦寒能損胃氣而傷脾陰脾肺虛熱者忌之故凡中寒作泄中寒腹痛肝腎虛而少腹痛血虛腹痛脾虛泄瀉腎虛溏瀉脾虛水腫血枯經閉氣虛小水不利肺寒喘欬及血虛胎不安陰虛淋露等證法並禁用○集方治痰火咳嗽氣盛喘急用黃芩三錢黑山梔蘇子各一錢五分茯苓杏仁各一錢水煎服○治小兒驚啼用黃芩人參各等分爲細末每服三五分白湯調下

○治產後發渴用黃芩麥門冬各五錢水煎服

本草
彙言

黃芩生柰歸山谷及寬旬八月採根圓者名子芩俗

呼條芩破者名宿芩俗呼片芩中心爛者名腐腸中

有孔者名內虛芩金也黃色應秋金也

味苦大寒無
毒主諸熱黃

疝腸澼洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱小
腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛

本草
原始

黃芩一名經芩一名空腸一名腐腸一名內虛一名

黃文一名印頭一名妬婦一名苦督郵內實者名子

芩一名狔尾芩一名條芩一名鼠尾芩川蜀河東陝

西近郡皆有之苗長尺餘莖粗如筍葉從地四面作
叢生亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫
花根如知母長四五寸二八月採根曝乾氣涼味微
苦而甘氣厚味薄得酒上得猪膽火得柴胡退寒熱
得厚朴黃連止腹痛得芍藥治下痢得桑白皮洩肺
火得五味牡蠣令人有子得白朮安胎得黃芪白斂
赤小豆療鼠瘻總之能治上焦皮膚風熱濕熱頭痛
奔豚熱痛火咳肺痿喉腥利胸中氣消痰隔諸失血
疔腫排膿乳癰發背婦人產後養陰退陽女子血閉

淋露下血小兒腹痛李時珍曰黃芩氣味苦色黃帶

綠若入心寒勝熱使心火治脾之濕熱一則金不受

刑一則胃火不流入肺即所以收神也肺虛不宜者

苦寒傷胃也其性寒能清金而心脾上焦之

熱心火不炎肺又虛脾胃中焦之症宜

用黃芩以治手足少陽相火之熱少陽本經藥也

○療治

三歲九脈思慮過度方云巴郡太守奏加減
三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦

人帶下足寒熱瀉五臟火春三月黃芩四兩大黃三
兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩

秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩
三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸

烏豆大米飲每服五九日三不知增至七九服一月
 病愈久服走及奔馬久用有驗禁食豬肉○三補丸
 治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃蘗等分爲末蒸
 餅丸梧子大每白湯下二三十九丸○肺中有火清金
 丸用片芩炒爲末水丸梧子大每服二三十九丸白湯
 下○小兒驚啼黃芩人參等分爲末一字水飲下○
 肝熱生翳不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩爲末
 每服三錢熱豬肝裹吃溫湯送下日二服忌酒麪○
 少陽頭痛不拘偏正片芩酒浸透晒乾爲末每服一
 錢茶酒任下○眉眶作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷
 等分爲末每服二錢茶下○吐血衄血或發或止積
 熱所致黃芩一兩去中心黑朽者爲末每服三錢水
 一盞煎六分和平溫服○吐衄下血黃芩三兩水三
 升煎一升半每溫服一盞亦治婦人崩漏○血淋熱
 痛黃芩一兩水煎熱服○婦人四十九歲已後天癸
 當住每月却行或過多不止條芩心二兩米醋浸七
 日炙乾又浸如此七次爲末醋糊丸梧子大每服七
 十丸空心溫酒下日二○崩中下血黃芩爲細末每

服一錢霹靂酒下許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也○安胎清熱條芩白朮等分炒為末米飲和丸梧子大每服五十九白湯下或加神麴凡妊婦調理以四物去地黃加白朮黃芩為末常服甚良○產後血渴飲水不止黃芩麥冬等分水煎溫服無時○老小火丹黃芩○典故李時珍曰予年二十時因感冒末水調塗之○典故咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盜汗暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先君偶思李杲治肺熱如火燎煩燥引飲而晝盛者氣分熱宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二種頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鼓應枹醫中之妙有如此哉○一人素多酒慾病小腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩水通甘草三味煎服遂止○一人灸火至五壯血出不止如尿手冷群方欲絕酒炒黃芩二錢爲末酒服止

黃芩味苦氣平性寒可降陰中微陽無毒入肺經大腸退熱除煩瀉膀胱之火止赤痢消赤眼善安胎氣解傷寒鬱蒸潤燥益肺氣但可爲臣使而不可爲君藥近人最善用之然又必肺與大腸膀胱之有火者用之始宜否則不可類用也古人云黃芩乃安胎之聖藥又因胎中有火故用之乎白朮歸身人參熟地杜仲之中自然胎安倘無火而寒虛胎動正恐得黃芩而反助其寒雖有參歸等藥補氣補血補陰未必胎氣之能固也況不用參歸等藥欲望其安胎萬無

是理矣○或問黃芩清肺之品也肺經之熱必須用之然又有肺熱用黃芩而轉甚者何也曰黃芩以清肺熱此正治之法也正治者治肺經之實邪肺經有實邪黃芩用之可以清熱肺經有虛邪黃芩用之適足以增寒然虛邪宜正治而虛邪宜緩治也○或問黃芩舉世用之而無疑與用知母黃柏頗相同乃先生止咎用知母黃柏之悞而不咎用黃芩何也曰黃芩又非可久用之藥然其性寒而不大甚但入于肺而不入于腎也夫上熱多而下熱者實少清上熱正

所以救下寒也雖多用又有損于胃然腎經未傷本
實不撥一用溫補便易還原其弊尚不至于殺人若
知母黃栢瀉腎中之火矣腎火銷亡脾胃必無生氣
上愈熱本欲救陰虛火動誰知反愈增其火哉下火
無根上火必滅欲不成陰寒世界得乎此用黃栢知
母之必宜闢也○或問黃芩乃清肺之藥肺氣熱則
腎水不能生用黃芩以清肺金正所以生腎水乎曰
黃芩但能清肺中之金安能生腎中之水夫肺雖爲
腎經之母肺處于上游居高潤下理之常也何以清

金而不能生水益肺中之火邪火而非真火也黃芩
止清肺之邪火耳邪火散而真水自生安在不可生
腎水然不知腎水之生必得真火之養黃芩能瀉邪
火而不能生真火此所以不能生腎水也予之取黃
芩者取其暫用以清金非取其久用以益水○或疑
黃芩之寒涼不及黃栢知母以黃芩味輕而性又善
散吾子攻黃栢知母宜也併及黃芩母乃過乎曰黃
芩之多用禍不及黃栢知母遠甚余未嘗有過責之
辭獨是攻擊知母黃栢在于黃芩門下而暢論之似

乎併及黃芩矣誰知借黃芩以論黃栢知母意重在黃栢知母也見黃芩之不宜多用益知黃栢知母之不可重用矣世重寒涼病深肺腑不如此又何以救

援哉

本草新編

黃芩

黃文

空腸

印頭

苦督郵

妬婦

枯

腸

腐腸

內虛子

事物異名

黃芩

今以亡言性寒味苦無毒治熱毒骨蒸寒熱

往來解熱渴瘵黃疸腸辟泄痢痰熱胃熱利小腸治

乳癰發背惡瘡及天行熱疾○生原野隨處有之三

月三日一云二月八月採根暴乾其腹中皆爛故一

名腐腸惟取深色堅實者為好圓者名子芩破者名

宿芩草本○中枯而飄故能瀉肺中之火消痰利氣入

手大陰經細實而堅者治下部瀉大腸火入水而沉

入藥酒炒上行便炒下行尋常生用入門子主腸辟下

膿血本草東醫鑑

黃芩 苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱治

辟痢腹痛便血曰辟寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實

宜補實宜下食宜消導瘀血宜行散痰濕宜化痰利

濕痛時手不可按者為實痛按之痛止者為虛痛

寒熱往來

邪在少陽

黃疸五淋血閉

實熱在血分

氣逆癰疽瘡

瘍及諸失血消痰

丹溪曰黃苓降痰假其降火也按痰因火動當先降火

利水

解渴安胎

胎孕宜清熱涼血養陰退陽補膀胱水酒血不妄行則胎安

炒則上行瀉肺火

下咽便好喻嘉言曰下痢必先汗解其外後調其內首用辛涼以解

表次用苦寒以攻裏機要云後重者宜下腹痛宜和身重宜除濕脉弦宜去風風內結宜汗身冷自汗宜

溫膿血稠粘宜重刺以竭之下痢赤屬血分白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒者非也通作濕熱處治但

有刺久虛

痞滿燥濕開鬱仲景治九種心腹疼痛熱心實之分

痛伏梁

心積目痛皆傷人乳浸點或合歸芍等分煎湯熱洗散熱活血癰疽瘡

疥

諸痛癢瘡酒毒胎毒小兒初生合甘明目傳信方

皆屬心火

草為末蜜調合

明目

半肝一

具黃連一兩搗丸凡是定驚鎮肝止汗解毒除疳同猪

目疾皆治名羊肝丸

為殺蛇虺得苦虛寒為病者禁用久服黃連苦參反

炎上作苦味苦必燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺伐傷

生和之氣也韓愈曰黃連與肉桂同行能交心腎于

頃刻時珍曰治痢用香連丸用黃連乾薑黃散用

黃連生薑左金丸用黃連吳茱萸治口瘡用黃連細

辛止下血用黃連大蒜一陰一陽寒出宣州者粗肥

因熱用熱因寒用最得製方之妙

出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良去毛治心火生

用虛火醋炒肝胆火猪肝汁炒上焦火酒炒有吞酸

症亦有吐酸者名酢心宜黃中焦火薑汁炒下焦火

連吳茱萸煎降火開鬱酢音酢

鹽水或童便炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱

萸湯炒在血分乾漆水炒點眼赤人乳浸

時珍曰諸法不獨爲

之引導益辛熱制其苦寒鹹寒制其燥性用者詳

黃芩龍骨爲使惡菊花利

胸中氣

肝主氣熱傷氣瀉熱所以保肝

治上焦之風熱濕熱

丹溪曰黃芩上

中二焦藥

火嗽喉腥

五臭肺爲腥

目赤腫痛過服損胃血虛寒

中者禁用

得柴胡退寒熱得芍藥治痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得白朮安胎之聖

藥揚士瀛曰柴胡及黃芩不退熱

黃明者良中虛者名枯芩卽片芩

瀉肺火消肌表之熱內實者名條芩卽子芩瀉大腸

火補膀胱水上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山茱龍

骨爲使畏丹皮丹砂

增訂本草備要

黃芩稟天地清寒之氣兼金之性味厚氣薄陰中微陽可升可降陰也入心肺肝膽大小腸時珍曰得酒則上行得豬膽汁除肝胆火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火皆取苦寒清肅之功 同芍藥黃連甘草車前子防風升麻治溼熱作泄腹痛 同芍藥黃連滑石甘草升麻治滯下腹痛 功能除熱而非補益之品如肺脾虛熱者之凡中寒作泄中寒腹痛肝腎虛而少腹痛血虛腹痛脾虛泄瀉腎虛泄瀉脾虛水腫血枯經閉肺受寒邪喘嗽及血虛

胎不安陰虛淋露法並禁

本草經疏輯要

黃芩味苦平主諸熱黃疸

大腸經中熱之鬱

腸辟洩痢

大腸府中

之鬱熱

逐水

水在腸下血閉中者

血之在陽明者使從大便出

惡瘡疽蝕

火瘍

陽明主肌肉凡肌肉熱毒病此皆除之

○此以形色為治黃芩中

空而色黃為大腸之藥故能除腸胃諸熱病○黃色

屬土屬脾大腸屬陽明燥金而黃芩之黃屬大腸何

也蓋胃與大腸為出納水穀之道皆統于脾又金多

借土之色以為色義詳決明條下相參益顯也

神農本草

經百種錄

芩其吟切音琴黃芩藥名莖幹粗如筍葉布地四面
叢生莖黃亦有獨莖者葉細長兩兩相對圓實而堅
者良新根內實者名子芩卽今條芩舊根空外黃內
黑者名宿芩卽今片芩或言西芩多中空而色黯北
芩多內實而深黃有腐腸空腸內虛黃文印頭諸名
又名苦督郵又名妬婦心黯故以比之又張仲景治
傷寒痞滿皆用黃芩以其去諸熱利小腸故也李杲
有獨芩湯治腹疼後重身熱頭眩四肢不屬昏瞶煩
苦甚驗○說文葢黃葢也芩草也引詩食野之芩竝

巨今切分爲二按苓莖實一字兼野苓黃苓二義从
今與从金音同苓當爲莖重文并可也正字通

空腸 腐腸 急就篇註黃苓一名空腸一名腐腸

莖 博雅莖黃苓也 經苓 子苓 宿苓

本草綱目黃苓一名經苓內實者名子苓 條苓

狍尾苓 鼠尾苓 陶弘景曰圓者名子苓破者

名宿苓 內虛 黃文 妬婦 印頭 本草綱目

宿苓乃舊根多中空外黃內黑卽今所謂片苓故有

內虛黃文妬婦印頭諸名妬婦心踏故以名之 苦

督郵 清異錄侯寧極藥譜苦督郵黃芩也事物異名錄

芩侵濁渠金切音琴黃芩藥名荃侵濁與芩同字彙

芩唐韵巨金切集韵韵會正韵渠金切拉音琴說文

草也又黃芩藥名本草註芩者黔也黔乃黃黑之色

也劉琨與兄子演書黃芩一斤皆所頒也柳宗元文

黃芩以腐腸註陶隱居云圓者名子芩破者名宿芩

康熙字典

原黃芩本草綱目云芩說文作荃謂其色黃一名經也或云芩者黔也黔乃黃黑之色也

芩一名空腸一名腐腸一名內虛一名黃文一名印

頭一名妒婦一名苦督郵內實者名子苓一名條苓

一名狍尾苓一名鼠尾苓本草註云圓者名子苓其腹中皆爛故

名腐腸綱目云宿苓乃舊根多中空外黃內黑即今

所謂片苓故又有腐腸妒婦諸名妒婦心黯故以此

之子苓乃新根多內實即今所謂條苓或云川蜀河

西苓多中空而色黔北苓多內實而深黃

東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖麤如筍葉從地四

面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長

色兩兩相對六月開紫花根如知母長五十二月

八月采根曝乾氣寒味微苦而甘氣厚味薄得酒上

行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得厚朴黃連

止腹痛得芍藥止下痢得桑白皮瀉肺火得五味子
牡蠣今人有子得白朮安胎得黃芪白斂赤小豆療
鼠瘻李時珍曰黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒
勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火
不流入肺卽所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃
損其母也少陽之證寒熱胸脇痞滿實兼心肺上焦
之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證
宜用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥
也別錄增物類相感志磨黃芩寫字在紙上以水沉

本草綱目
去紙則字畫脫在水面上

本草綱目
予年二十時

因感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎
每日吐痰盈許暑月煩渴寢食既廢六脉浮洪遍服
柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死矣先
君偶思李杲治肺熱如火燎煩燥引飲而晝盛者氣
分熱宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用
片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰
嗽皆愈藥中肩臂如鼓應桴醫中之妙有如此哉
廣羣

芳譜

藥品 黃芩 類 紫草高一尺許六月開紫花永根療肺

火甚捷

歲輔通志

濟南府藥物黃芩一百三十三斤 兗州府黃芩二百

四十七斤 東昌府黃芩三十五斤 青州府黃芩三百

四十三斤 登州府黃芩四十九斤 萊州府黃芩六十

斤

山東通志

黃芩

和名

安末比比羅岐又波比志波

異名

腐腸本經

空腸

別錄

內虛

同妬婦

吳普經

芩

別錄

黃文

同

增補異名印

頭

吳普

苦督郵

記事

內實者名子芩

弘景

條芩

綱目

狹尾芩

唐本

鼠尾苓

多識編

黃芩味平主諸熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡

疽蝕火瘍一名腐腸

神農本草

黃芩大寒無毒療痰熱

胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血

小兒腹痛一名空腸一名內虛一名黃支一名經苓

一名妬婦其子主腸澼膿血生絛歸川谷及冤句三

月三日採根陰乾

梁陶弘景名醫別錄

得厚朴黃連止腹痛

得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白欬赤小豆

療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡蔥實畏丹砂牡丹藜

蘆陶隱居云柳歸屬建平郡今第一出彭澤州亦有
之圓者名子苓爲勝破者名宿苓其腹中皆爛故名
腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須唐
本注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出
宜州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名狔尾苓也
臣禹錫等謹按藥性論云黃苓臣味苦甘能治熱毒
骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢
去關節煩悶解熱渴治熱腹中疴痛心腹堅脹日華
子云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背
嘉祐補註

本

草 黃芩生狝歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近

郡皆有之苗長尺餘莖薜薶如筋葉從地四面作叢
生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩
相對六月開紫花根黃如知母薶細長四五寸二月
八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一
名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或
方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月
採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯
四方皆用黃芩以其主諸熱痢小腸故也又太陽病

下之痢不止者葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散
亦多用黃芩今醫家嘗用有效者因著之又千金方
巴郡太守葵加減三黃丸療男子五勞七傷消渴不
生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大
黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連
七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月
黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時搗下篩蜜
丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七丸服一
月愈久服走及奔馬逆頗有驗食禁豬肉又陶隱居

本草綱目

云黃芩圓者名子芩張仲景治雜病方多用之

宋蘇頌圖經本

草

芩說文作荃謂其色黃也或云芩者黔也黔乃

黃黑之色也宿芩乃舊根多中空外黃內黑卽今謂

片芩故又有腐腸妬婦諸名妬婦心黯故以比之子

芩乃新根多內實卽今所謂條芩或云西芩多中空

而色黔北芩多內實而深黃

明李時珍本草綱目

黃芩始生

稱歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗

長尺餘莖幹竈如筍葉從地四面作叢生類紫草高

一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開

紫花根黃色長四五寸二月八月採根暴乾根圓實者弘景名子苓俗呼條苓破者名宿苓俗呼片苓內心空腐色黯者本經名腐腸別錄名空腸名內虛吳普名妬婦妬婦心黯故以比之說文苓作荃謂其色黃也氣味苦平無毒臣藥也 條苓形圓堅實片苓

破飄成片枯苓中心朽爛

明李中立本草原始

陶隱居曰黃

苓生建平郡及宛句山谷彭蠡州及宜州鄆州涇州今川蜀河東陝西諸郡亦有俱二月三苗長尺餘莖幹粗如筍中立外方葉色黃赤從地四面叢生五月

開花花色紫實色黑根色黃圓者名子苓曰條苓卽
小根之內實者根破者名宿苓卽大根之內虛者其
心黑爛故有腐腸妬婦諸名又一種獨莖者其葉細
長而青根如知母粗細長四五寸八月采根暴乾又
云西苓多中空而色黯北苓多內實而深黃兗州一

種大而實者多狹尾苓亦妙

清倪朱謨
本草彙言

說文曰莖

黃苓也

范子計然曰黃苓出三輔色黃者善

太平御覽

苓陸機云莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地鹹處

爲葷真實牛馬亦喜食之

明馮陽京天
家詩名物疏

黃苓生神

歸山谷及宛句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長
尺餘莖篠窻如筍葉從地四面作叢生類紫草高一
尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫
花根黃如知母窻細長四五寸二月八月採根暴乾
用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生
赤黃葉兩兩四四相值其莖中空或方圓高三四尺
花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採一名腐腸一
名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦味
苦大寒無毒治骨蒸寒熱往來腸胃不利治丁瘡排

本草通串
膿乳癰發背

明王思義
三才圖會

本草爾雅埤雅皆不載陸

璣詩疏云莖如釵股葉如竹蔓生澤中下地牛馬喜食之又黃芩藥名莖韃粗如筴葉布地四面叢生莖黃亦有獨莖者葉細長兩兩相對圓實而堅者良新根內實者名子芩卽今條芩舊根中空外黃內黑者名宿芩卽今片芩或言西芩中空而色黯北芩多內實而深黃有腐腸空腸內虛黃文印頭諸名又名苦督郵又名妬婦妬婦心黯故以比之說文蒼黃蒼也芩草也引詩食野之芩拉巨今切分爲二按芩蒼

實一字兼野芩黃芩二義从今與从金音同芩當爲

荃重文并可也

清寥綸璣
正字通

機謹按陸璣詩疏所載

芩草非黃芩別種也古昔以博落迴根爲黃芩誤也

又姦商以南天竹根假僞宜辨認矣近世自對馬州

上于朝鮮國之生草今處處植焉 物類相感志磨

黃芩寫字在紙上以水沉去紙則字畫脫在水面上

廣群芳譜

黃芩類紫草高一尺許六月開紫花承根療

肺火甚捷

鐵輔增補庶
通志物類纂

黃芩苦寒破爛者名宿芩乃舊根多中空外黃內黑

本草綱目

卽今所謂片苓也。圓者名子苓，乃新根，多肉實，堅卽今所謂條苓也。深色堅實者佳，刮去外衣，內朽切片，酒炒上升。山茱萸、龍骨爲使，惡蔥實、畏牡丹皮、藜蘆、丹砂。○姦商多以南天竹、撒沙爺（音沙爺）起草根，假偽亂真，用者宜辨認。本草喉襟

黃苓 腐腸 空腸 內虛 奸婦 經苓 黃文

印頭 苦督郵 本綱黃苓川蜀河東陝西多有

之苗長尺餘，莖幹粗如筍，葉從地四面作叢生，類紫草，高一尺許，亦有獨莖者，葉細長青色，兩兩相對六

月開紫花根如知母粗細長四五寸氣味微苦而甘涼氣厚味

薄 浮而升陽中陰也入手少陽陽明經其用有九

瀉肺熱 一去上焦皮膚風熱風濕 二去諸熱 三利胸

中氣 四消痰膈 五除脾經諸濕 六夏月須用 七婦人

產後養陰退陽 八安胎 九酒炒上行主上部積血非

此不能除下痢膿血腹痛後重身熱久不能止者與

芍藥甘草同用之凡諸瘡痛不可忍者宜荅連苦寒

之藥也 山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆 得厚

朴黃連止腹 得五味子牡蠣令人 得黃芪白欬

赤小豆療鼠瘻

得柴胡退寒熱

得桑白皮火瀉肺

得

白朮安胎

○宿苓又云片苓腐腸

舊根多中空外黃內黑謂

之宿苓瀉肺火利氣消痰除風熱清肌表之熱○條

苓又云子苓

新根多肉實謂之條苓瀉大腸火養陰退

陽補膀胱寒水滋其化源倭漢三才圖會

黃苓

和名

ハイシバ

ハイシバノ名アリト

雖氏本ト本邦ニナシ近代朝鮮ヨリ來ル種ヲ傳

ヘテ山家及人家ニモ栽ユ舊根ヨリ新芽ヲ出ス

葉ハ武者リンドウト云フ草ニヨク似タリ未ニ

紫花ヲヒラク後子ヲ結ブ黒ク蠶沙ノ如シ是ヲ
地ニ下セバ能苗ヲ生ス根ハ船來ヨリ甚見分ヨ
シ本草花
蒔繪

黄芩釋名時珍曰芩說文作荃謂其色黄也或曰芩
者黔也黔乃黄黑之色也修治削去腐剉酒浸干焙
用頃日有朝鮮黄芩者色淺味薄功能不如中華產
矣氣味苦寒無毒能入肺太陽二經山茱萸龍骨爲
使療痰熱胃中熱小腹絞痛治風熱濕熱頭痛中枯
而大者清肺止嗽化痰目赤疔癰堅實而細者瀉大

腸火除濕治痢安胎利水毒惡蔥實畏丹砂丹皮藜

蘆沙參丹參肺虛脉沈細肌冷微咳者冷痢者脾胃

虛甚者食寒冷物腹痛小便不利脉不數者皆禁用

修治 本書ノ如シ唐アツテ和チシ唐タミ一種真

アリ本書ニ朝鮮黃芩ト云モノハ何物ヤラ不知

和ニチヤンハ菊ト云モノヲ以テ黃芩トス此毒

草ナリ不可用今藥肆ニアル中空ニウツロナル

モノヲ枯芩ト云肺ニ入ル細ク中ノ實シタルヲ

子芩ト云大腸ニ入ル俱ニ酒製スベシ能 本書ノ

如シ此藥火ヲ治シ熱ヲ除クノ妙劑ナリ諸方多
ク黃連トナラベ用ル柴胡ハ熱ノ標ヲ治シ黃芩
ハ熱ノ本ヲ治ス氣分ニ入ルユヘニ肺家ノ本藥
トス血分ニモ入ルユヘ血閉惡瘡ヲ治ス吐血衄
血ニモ用ユ或ハ灸瘡血出不止ニモヒ子リ力ケ
テ止ル畢竟一切實火ノ藥ト意得ベシ巽齋云近
年朝鮮ノ種子渡リテ植ル真ナリ和州ニテ真黃
芩ト云テ出ス藥舗朝鮮黃芩ニ交テ賣ル下品ナ
リ漢渡モ上品ノモノ希ナリ擇ムベシ片王六
本草

黃芩試效療諸熱傷風寒時疫大熱潮熱膚熱如燎

胃熱口瘡爛痛牙疼欬嗽吐血衄血下血血淋熱痛

痢疾腹痛瘧熱熱渴目中腫赤翳膜小腹絞痛安胎

喉腥火瘍撰修凡撰黃芩以華舶貨來色黃帶青綠

者爲佳自朝鮮來者色尤青綠亦佳用時削去內腐

水洗剉細凡酒洗酒炒等制及分身與梢用皆不取

世醫以呼薩サ薩サ鷄キ吉ダ薩サ者爲和上黃芩甚非也真黃

芩官園種之望之類紫草葉似柳葉葉葉而青開紫

花殊繁茂足愛觀又藥舖以南天燭根混賣慎擇去

之勿用辨正切破去中腐成片者呼爲片苓宿苓卽
是舊根內實而圓者呼爲子苓條苓狔尾苓鼠尾苓
卽是新根此唯由新舊根形異耳性味效用非有不
同然張元素曰酒炒上行詳上下分身梢李杲曰片
苓治肺火條苓治大腸火高下之分與枳實枳殼同
例如此二說妄誕過鑿有害于治事拒却之可也一本

堂藥撰

黃苓 漢アツテ和ナシ漢タビ一種無偽雜和二
一種子ヤンバギク一名サ、ヤキ草一名シ、ヤ

本草綱目

キ草ト云モノヲ以テ充_レ之_ニ俗醫以テ和黃芩トス

此レ毒アリ誤用レバ害_ス人_ヲソノサ、ヤキ草和方

ニ燒テ爲_レ霜丸散ノ用トス絶テ非_ニ黃芩之類_ニ此却

テ白屈菜ノ種類ナリ又以_ニ南天燭根偽造シテ雜

賣之可能擇_ニ諸藥畧稱_ニ片芩_ニ片黃_ニ條芩_ニ條黃_ニ子

芩_子黃_芩 苦督郵_{黃芩用藥一名須知}

黃芩 和ニナシ大根ノ物羊蹄草ニ似タリ然_レ氏

未詳唐ヲ用ユ佳ナリ詩小雅鹿鳴ノ芩ト云ハ別

ナリ草ノ葉ヲ云 會誌云和ニナシ和ノ黃芩ハ毒

草ノ部ニ博落廻ト云物毒草ナリ 和名 サ、

ヤキグサ シ、ヤキ草ト云 子マンパギクト

モ云

秘物ナリ

本草
會誌

照任曰武州大澤ノ麓ヨリ黄芩ヲ出ス又小杉ヨ
リモ出ル 和黄芩ノ始ナリ即チ官園ニ植ル

先生按スルニ黄芩日本古ヘハアリシニヤ延喜
式ニノセタリ今江東ニテ専ラ作ル黄芩ハ長サ
一尺バカリ葉兩々對生シ葉ニ毛アリ七月頃紫
碧花ヲ開ク秋ニ至テ實ヲ結ヒ蠶砂ノ形ノ如ク

根ハ宿根ヨリ春生ス實ヲ毛蒔ク中華ヨリ來ル

二性劣ラズト云ヘリ

採藥使記

撰修曰凡撰黃芩以華舶貨來色黃帶青綠者爲佳

齋按帶青綠三字當刪此物本以黃明者爲佳帶

青綠者乃是年年在坊間積累鬱蒸然非其本色也

綠青黃間色而又或徽義唐柳子厚寄周韶州詩印

文生綠經旬合註印不用而綠生可以見耳 又曰

朝鮮來者尤青綠亦佳

齋按此物以色爲名尤青

綠者旣失其名義不用可

又曰真黃芩者官園種

之望之類紫草葉似桺葉菜葉而青開紫花殊繁茂
足愛觀

齋按此說觀予園中者有所未說盡宿根
至春生芽莖方長尺許葉兩兩對生俱有毛自六月
以至八月枝枝代謝開小筒紫碧花至深秋結實色
黑如蠶砂狀而至小卽今坊間稱和苓者此種而味
微帶鹹亦優於華產陳腐者也速矣奸賈或稱韓苓
瞞盲醫要高價亦不可不察焉 辨正曰爾爾此唯
因新舊根形異耳性味效用非有不同然張元素曰
爾爾李杲曰爾爾云云

齋按此物子種而四五年

以內者中實六七年以外者中腐性劣修德強駁斯
二氏亦曰性味効用非有不同者其失則相近皆是
不自種而熟視之誤耳非藥選

黄芩 俗和黃芩ト稱スルモノ真物ニアラズ○

漢種上品享保中種子ヲ傳フ今世上ニ多シ物類品騰

黄芩 ヤマヒヒラギ延喜式 コガ子ヤナギ種樹家

今ハ通名 一名枯腸事物異名 裏腐草採取月今 裏

朽斤草同上 裏朽草村家方 枯黄芩遵生八牋 片黄芩

醫學 正傳 枯芩本草原始 子芩一名莖薹通 條黄芩

遵生
八牋

實苳

藥性要
畧大全

市中ニ販クトコロ三品ア

リ唐朝鮮真ナリ唐ヲ上品トス輕クノ色黃黑味
最苦シ其色黑三ノ多キ者ヲ シンチウデト云
是老根ナリ釋名ニ老根嫩根ノ名ヲ別ツ前ニ出
ス八名ハ皆老根ナリ形大ニノ内虚ス後ニ列ス
ル四名ハ皆嫩根ナリ形細長ニノ内實ス此ヲ藥
舖ニテ軸^{カク}樣^デト云朝鮮ハ唐ヨリ黃色鮮カニノ堅
實苦味ウスシ故ニ下品トス朝鮮ノ中ニモ唐樣^デ
ト呼モノハ形色混ジ易シ此亦苦味薄シ其真ノ

黄芩ト呼者ハ卽朝鮮ノ種ヲ栽シ者ナリ和州宇
陀ヨリ出ス根色鮮ナレ_レ苦味ウスク_ノ脂_{ヤニ}多シ
最下品ナリ其苗高サ二三尺一根ニ叢生ス葉ハ
_{ミツハギ}千屈菜葉ニ似テ毛茸アリ兩對ス秋ニ至リ莖末
ニ穗ヲナス長サ四五寸花ノ長サ一寸許本ハ細
筒ニ_ノ端ハ五瓣ニ分レコラセウモンノ花ノ
如クニ_ノ紫色ナリ又淡紫色又青色ヲ帶ル者又
白色アリ白色ノ者ハ希ナリ花後萼中ニ四ノ小
黒子アリ子熟ノ苗枯子ヲ種テ生シ易シ根ハ年

ヲ經テ枯ズ然レ久キモノハ内腐テ枯易シ又一
種古ヨリ和ノ黄芩ト呼來ル草アリ　サ、ヤキ
グサレチヤンバギクレ云是博落迴ナリ毒草類
草麻ノ附録ニ出其根ノ形色微ク黄芩ニ似タリ
故ニ藥肆ニテ黄芩ニ雜ユ此ヲ　サシコミト稱
ス此草ハ山中ニ多シ根ハ肥大ニノ蠹蛀ノ内空
ニナリタルモアリ然レ此根ハ極テ乾ト雖レ猶
軟ナリ黄芩ノ堅脆ナルニ異ナリ
本草綱目啓蒙
黄芩　ヤマヒ、ラキ　今花肆及人家苑中ニ植

本草 五 百 二

フ宿根ヨリ生ス高サ尺餘莖粗サ筍ノ如シ葉青

鑒草ニ似テ毛アリ叢生ス亦醉魚草ノ莖葉ニ似

テ細小五六月紫花ヲ開ク根黃色羊蹄大黃ノゴ

トシ長サ四五寸舊根多中空ナリ外黃ニメ内黒

シ新根ハ多ク内實ス

花

紫苓

三因方

クチデノ黄苓

藥名考

黄苓草

六月花

花形ウツボ草ニ似テナガクウスギ

キヤウニシテウツボ草ノゴトシ葉向ヒ合出テ

ミソハギノゴトシ長尺餘山谷ニ生ズ

繪本野
山草

黄芩

黄文

アマヒラギ

唐佳朝鮮亞之片芩

ト称シワリタルモノアリ功用同シ和不好オウラ○印

頭　　ワウゴンナリ○独尾芩　　ワウゴンナリ○

妒婦　　ワウゴンナリ○鼠尾芩　　ワウゴン子サ

キ○内虚　　ワウゴンナリ○空腸　　ワウゴンナ

リ○經芩　　ワウゴンナリ○腐腸　　ワウゴンナ

リ○芩　　ワウゴンナリ○子芩　　ワウゴンノ實

シタルモノ○條芩　　ワウゴンノ實シタルモノ

藥品手

引草

本草通串

黄芩

黄芩 市家ニ真ト呼モノハ山城ニテ作ル粘ア

リ不佳朝鮮ト呼モノハ薩摩ヨリ來ル色深黄ニ

ノ濕アリコレヲ折レバ柱ニテ斷折セズ苦味峻

ニノ氣薄シ俱ニ用ベカラズ漢種 官園ニアリ

莖全ク千屈菜ニ似テ直上ス末ニ小枝アリ葉狹

長ニノ尖リ微シ硬ク毛アルニ似タリ葉密ナリ

花穂ヲ成シ簇生ス千屈菜花ノ如シ赤紫ノ二色

アリ市家ヒラ様ト呼モノハ片苓ナリ大ナルモ

ノヲ破リ中ノ腐ヲ去テ扁タメタルナリ是佳ナ

リ用ベシ子苓弘景八圖者名子苓東璧曰子苓乃

新根多内實卽今所謂條苓ト云ヘリ

千金方
藥註

黃苓 用藥須知ニ漢アツテ和ナシト云近時和

産出ツ真ナリ然レモ漢渡ヲ可用又和ニ一種チ

ヤン。バキク一名サ、ヤキ草一名シ、ヤキ草ト

云物ヲ以テコレニ充俗醫以和黃苓トス毒アリ

誤用ユレバ害人愚按サ、ヤキ草ハ駿州ニテ竹

煮草ト云日光ニテハ草ノ黃ト云此草黃汁出ツ

是ヲ以テ黃漆ニ用ユ是本草綱目蓖麻子ノ附錄

博落迴ナリ藏器有大毒殺人ト云近時信州邊ヨ
 リ製法ノ藥店ニ出シ朝鮮黃芩ト云庸醫價ノ賤
 シキヲ以テ用之宜慎本草正譌

黃芩經本

元素曰凡諸瘡痛不可忍者宜芩連苦寒

之藥詳上下分根梢及引經之藥用之此說非元素
 之言出於東垣用藥心法隨證治病藥品條曰諸瘡
 痛不可忍者用苦寒藥如黃芩黃蘗詳上下用根梢
 及引經藥則可也是東垣用藥凡例而言黃芩黃蘗
 之類如字可見東壁改作芩連而附會於此條以爲

從瘡上下芩連分根梢用之者大反於東垣之意矣
心法所說詳上下用根梢言當歸甘草之類豈芩連
分根梢而用之乎東壁附於此者誤矣珍珠囊曰瘡
痛甚者加用黃芩黃連黃蘗知母上焦有瘡須用黃
芩中焦有瘡須用黃連下焦有瘡須用黃蘗知母防
己元素上中下用藥之別與李杲所說亦異矣

本草
鈞衡

黃芩

一名虹勝

本草和名
引釋藥性

經芩

媚眉

印頭

共二
同上

青麴

同上引
華陀方

北節

同上

和名

匕、

う

牛草

和名

ヤ

ニ

、

う

延喜
式

コ

ガ

子

ヤ

ナ

京花
朝

鮮ヨリ移シ裁テ今諸國ニアリ春宿根ヨリ生ズ
 葉ハ柳ニ似テ短ク鋸齒ナク微毛茸アリ又千屈
 菜ニ似テ又狹長兩對ス秋月莖高サ二三尺梢ニ
 穂ヲナシ節間コトニ紫碧花ヲ開クモ本筒ニシテ
 赤唇ノ如ク形チタツナミサウニ似タリ後實アリ
 扁平骨突ヲ結ヒ中ニ細黒子アリ子ヲ種テヨク
 生ズ又白花ノモノアリ形狀同ジ根ハ小ナルモ
 ノ母指ノ大サ長サ二尺許皮黄褐色内黄色ナリ
 味苦シ黄芩ハ唐ヲ上トス唐ハ片ヲナシ黄色ニ

シテ微青黒ヲ帶ブ輕ノ味甚苦シ黒ヲ帶ルモノ

ヲ瑜石様ト云是老根ナリコレ片黄芩醫學ニニ枯

芩本草始ナリ嫩根ハ指ノ大サ一二尺内實スコレ

ヲジクデト云コレ子芩ナリ一名條黄芩遵生十

リ朝鮮ヨリ來ルハ苦味薄ク下品ナリ又古ヨリ

和ノ黄芩ト云モノハ和名サ、ヤキグサ一名子

ヤンバギク氏云コレ即毒草類蓖麻ノ附録ノ博

落廻ナリ毒アリ用ユベカラズ本草

黄芩 コガ子ヤナギ 種朝鮮ヨリ渡リ多ク作

ル葉ハ千屈菜ハミソニ似テ狭ク對生シ高サ二三
 尺花ハ本筒ニシテ末唇ノ如ク紫碧色後扁キ骨
 突ヲ結ブ中ニ細キ黒子アリ一種白花ノモノアリ
 リ根大ナルモノニ尺許皮黃褐色肉黃色味苦シ

一種 白花ノ物 本草圖譜

黃芩 草本 和名 ヤマヒ、ラギ 和名 俗ニコガ子

ヤナギトイフ花ニ白ト碧トアリ享保年中將翁
 先生甲州ヨリ採リ得テ 官園ニ上ル又漢種モ
 享保年間唐山ヨリ來ル予 會津山中ニテ自生ノ

モノヲ得タリ形狀皆同シ根腐リテ上品ナリ春
分ノ比畦ニ種子ヲ布テ生ス其年ニ花實アリ當
時江戸近郊ニテモ多ク作ル是ヲ真ノ黄芩トイ
フ作り方惡シキ故ニ藥用ニ下品ナリ山中赤土
ノ地ヲ選ニ是ニ畦ヲ作り草綿子糠ノ類キリ雜
ヘ是ヘ種子ヲ布キ其後ハ糞水モ少シモ澆グ事
ナク七八年過掘り出シ見ルベシ蘆頭腐リテヨ
シ世間ニテ作ルハ斤兩ノ減スル事ヲ恐レテ糞
汁多ク用ヒ三年ニシテ掘ル故ニ効ナシ又山中

本草綱目

野地ノ分チナクフリ蒔ニノ數十年ノ後採リ得

バ自然生ノ如ク彌上品ナルベシ草水育種後編

黄芩

ハ比之也本草和名

○ヤマヒハラギ延喜式

○コ

ガ子ヤナギ

黄芩

○比々良ギ黄芩和名

本草藥名備考

和訓

黄芩

綱目

印頭普具

苦督記

腐腸本經

空腸別錄

經芩

同上

黄文同上

莖品字

赤金丹臺玉案

コガ子

ヤナギ

近世ウエ水屋ノ名ツクル所ナリ

本邦唐朝鮮ノ三種ウ

工水屋ニアリワケテ多キハ朝鮮ノ種子リ葉ノ

形千屈菜ミソハギニ似テ一根叢生ス高サ一二尺バカリ

葉ニ白毛アリ莖ニ兩對シテツケリ秋ニイタリ

テ莖ノ端ニ五寸バカリノ穂ヲナシテ花アリ紫

色ニノ筒ザキ花ノ先サキ五ベンニワカレテウスム

ラサキモアリ白花モアリ

四季賞
花集

黄芩 和産絶無漢渡常有宜揀取黄黑間色味全

者必不可拘中虚内實矣朝鮮産時或有之稍劣今

大和宇陀及他方亦栽培之肆中所謂真黄芩是也

尤屬下品

本草綱目
纂疏

黄芩 物品

黄芩 根 山景曰惟深黑色堅實者好凡ソ其形大

ハ根ナリ方書ニ云コレナリ漢

渡ノモノ黄黑色ニノ苦味多シ上品ナリ藥舖ニ

扁様或ハ眞鍮様ト呼モノ又大オホバ子ト呼モノハ

老根ナリ軸様ト呼モノハ嫩根ナリ朝鮮ヨリ來

ルモノハ鮮黄色ニノ苦味少ナシ次品トス 和

産ハ皆朝鮮種ヲ栽シモノナリ諸州ヨリ出ルモノ

ノ藥舖ニ賣シコレヲ眞ノ黄芩ト云黄色鮮アサキケレ

氏輕虛ニノ氣味薄シ下品ナリスベテ陳久ナル
モノハ黒色ヲ帶ブ市人或ハコレヲ黒様ト云日
藥品考

黄芩 條芩 空腸 唐枯芩 朝鮮 丸軸 真

朝鮮ノ種ナリ 山剥今手板發蒙

黄芩清涼宜利膀胱 延喜式ヤ今通名別錄一名黄文 本經曰

黄芩味苦平主諸熱黄疸腸癖洩痢逐水下血閉別

錄曰大寒無毒療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小

腸女子血閉案其根性自下降氣味苦寒故其能清

涼實熱通利膀胱以治下利葛根黃連黃芩湯太陽
病桂枝症醫反下之利遂不止脈促者表未解也喘
而汗出者黃芩湯太陽少陽合病自下利者云云

撰品黃芩邦產舶來有數品其漢渡者形如茈胡而
重實皮茶褐色肉黃綠色苦味厚者為良品呼為唐
黃芩又朝鮮黃芩形色如唐黃芩而肥大肉深黃苦
味不厚者次之藥舖分其緊實者呼_ニ尼_デ久_ク樣_ヤ所謂修
芩或子芩是也又分其老根及中虛者呼_ニ比_ヒ良_ラ樣_デ所
謂枯芩或片芩是也今俗好朝鮮黃芩之肥大深黃

者是以市人取唐黃芩肥大者僞呼爲朝鮮黃芩其
倒置虛妄如此大抵不拘根大小肉黃綠色味極苦
者可撰用又邦產者總稱真黃芩形如唐黃芩而長
五七寸不去粗皮者呼加波ハ都ツ幾キ出薩州上州遠州
者可用此呼唐種カ或江戶黃芩又長尺許刮去粗皮
色鮮黃者呼也武ム幾キ出和州伊州等此爲次凡多
脂膩色易變黯黑者不堪用是皆享保中所傳之漢
種然以不應風土與舶來者不同又舊說以南燭根
及博落迴根ハシ作云今無之○黃芩春生芽方莖高

二三尺叢生葉似千屈菜而兩々相對秋發穗開紫

花根如桔梗而黃色

古方藥
品考

宿莽

黃芩ノ舊根ナリ又片莽氏云宿根ノ中空


ニノ外黃ニノ内黒キ毛ノ條莽新根ノ内實スル

毛ノナリ又子莽黃ト毛云

用藥須知續編
前誤逸今追載此

本草通串卷四十一

本草通串卷四十一



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

秦艽

秦艽味苦平主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利

小便

神農本草經
大觀本草

秦艽

省交○本
經中品

主治

寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下

水利小便

經本神農本草綱目

秦艽味苦平主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利

小便

神農本草經
盧復手錄

秦艽味苦平主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利

小便

神農本草經疏
○吳懷祖輯要

秦艽

膠字

味苦平主寒熱邪氣寒溼風痺肢節痛下水

利小便

神農本草經
補底物類纂

秦艽味辛微溫無毒療風無問久新通身攣急生飛

烏山谷二月八月採根暴乾

名醫別錄
大觀本草

秦艽集解別錄曰秦艽生飛鳥山谷二月八月采根

暴乾氣味別錄曰辛微溫主治療風無問久新通身

攣急別名醫別錄本草綱目○

秦艽辛微溫無毒療風無問久新通身攣急生飛鳥

山谷二月八月採根暴乾梁陶弘景名醫別錄○增補底物類纂

爾雅伯益之後所封國地宜禾从禾春省曰秦禾名匹鄰

切楚遠荒也从艸九聲詩曰至于艽野巨鳩切說文

陶隱居云飛鳥或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大

黃白色爲佳根皆作羅文相交中多啣土用之熱破

除去方家多有秦膠字與獨活療風常用道家不須

雨

神農本草陶弘景註
○大觀本草

集解

弘景曰今出甘松龍洞蠶陵以根作羅紋相交

長大黃白色者爲佳中多冲土用宜破去

神農本草陶弘景註

○本草綱目

雷公曰凡使秦并芄須於脚文處認取左文列爲秦

卽治疾芄卽發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡

然後用還元湯浸一宿至明出日乾用

炮炙論
○大觀本草

根修治敷曰秦芄須於脚文處認取左文列爲秦治

疾右文列爲芎卽發脚氣凡用秦以布拭去黃白毛

乃用還元湯浸一宿日乾用炮炙論○本草綱目

菖蒲爲之使徐之才藥對○大觀本草

氣味之才曰菖蒲爲之使畏生乳藥對○本草綱目

本草云菖蒲爲之使藥對○湯液本草

藥性論云秦芎解水脂人食谷不充悅畏生乳點服之利大小便差五腫黃病解酒毒去頭風秦性論○大觀本草

主治牛乳點服利大小便療酒黃黃疸解酒毒去頭

風甄藥性論○大觀本草綱目

秦艸味苦辛平微溫無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢

節痛下水利小便療風無問久新通身寧急生飛鳥

山谷二月八月採根暴乾

千金翼方

唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本作紕或作糾

作膠正作芄也

唐本注○大觀本草

釋名秦紕

唐本

○恭曰秦艸俗作秦膠本名秦紕與糾

同集解

恭曰今出涇州鄜州岐州者良

唐本注○本草綱目

蕭炳云本經名秦艸世人以療酒黃黃疸大効

四聲本草

○大觀
本草

釋名 秦艽 蕭炳四聲本草綱目 ○

久差波自加民 一名多加 味辛 久香之 十一月採根切

蒸天 卷覆三日 乃後取出而晒乾用之 大同類聚方

臣禹錫等謹按藥性論秦艽解水脂人食谷不充悅

畏牛乳點服之利大小便差五腫黃病解酒毒去頭

風 蜀本草掌禹錫按○大觀本草

秦艽 仁謂一名秦膠 蘇敬注云字或作利 和名都音交

加利久佐一名波加利久佐 本草和名

尤右近衛府各四十七種 秦膠 ○下野國十四種

秦膠十六斤○陸奧國六種

秦膠四十斤延喜式

秦苳 本草云秦苳音交和名都加生久佐一云波

加里久散和名類聚抄

曰華子云味苦冷主傳尸骨蒸治瘡及時氣又名秦

瓜羅紋者佳日華本草大觀本草

氣味大明曰苦冷主治傳尸骨蒸治瘡及時氣大日明華

子大明○
本草綱目

圖經曰秦苳生飛鳥山谷今河陝州單多有之根土黃色而相交糾長一尺已來莖細不等枝幹高五六

寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得快利三五行卽差法並同此又治黃方用秦艽一大兩細剉作兩點子以上好酒一升每貼半斤酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤噉鼠糞

亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文者

圖經○大觀本草

集解

頌曰今河陝州郡多有之其根土黃色而相交

糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆婆連

莖梗俱青色如萑葉六月中開花紫色似葛花當

月結子每於春秋永根陰乾

蘇頌圖經○本草綱目

秦州秦艽

苳音膠

齊州秦艽

石州秦艽

寧化軍

秦艽

二月八月備急本採根暴乾草圖按

珍云去手陽明經下牙痛口瘡毒去水經風濕

張元素珍

珠囊○湯
液本草

氣味元素曰氣微溫味苦辛陰中微陽可升可降入

手陽明經主治除陽明風濕及手足不遂口噤牙痛

口瘡腸風瀉血養血榮筋

元張元素○
素本草綱目

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治黃病骨蒸

治口禁及腸風瀉血去蘆用

李東垣藥類法
象湯液本草

秦艽氣微溫味苦辛陰中微陽手陽明經藥本草

云菖蒲爲之使

湯液
本草

主治泄熱益膽氣好王好古

秦艽

菖蒲爲之使

味苦辛平性微溫無毒可升可降陰中

之陽也其用有二除四肢風濕若神療遍體黃疸如

金秦艽

治疸時行勞熱猶能

李杲藥性賦

產家大器

秦艽錄輟耕

秦艽

味苦辛氣平微溫可升可降陰中陽也無毒

出甘松龍洞及河陝諸州長大黃白色爲優新好羅

紋者尤妙用菖蒲爲使入大腸手經養血榮筋除風

疸肢節俱痛通便利水散黃疸遍體如金誅頭風解

酒毒止腸風下血去骨蒸傳尸

本草蒙筌

秦艽味苦辛性微溫無毒入胃大小腸三經主骨蒸

腸風瀉血活筋血利大小便除風濕療黃疸解酒毒

去頭風芎藭爲使羅紋者佳 按秦艽苦則涌泄爲

陰故入大小腸以療諸濕辛則發散爲陽故入陽明

經以療諸風骨蒸之症亦濕勝風淫所致宜並理之

雷公云

凡使秦并芎須於脚文處認取左文列爲秦卽治疾芎卽發脚氣凡用秦先以布拭

上黃肉毛盡然後用還元湯鑄補雷公炮浸一宿至明出日乾用之製藥性解

秦艽釋名時珍曰秦艽出秦中以根作羅紋交糾者

佳故名秦艽秦紉根修治時珍曰秦艽但以左文者

爲良分秦與艽爲二名謬矣主治治胃熱虛勞發熱

時珍發明時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故

手足不遂黃疸煩渴之病煩之取其去陽明之濕熱

也陽明有濕則身體酸疼煩熱有熱則日晡潮熱骨

蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼用秦艽柴胡

一兩甘草五錢爲末每服三錢白湯調下治小兒骨

蒸潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草各一兩每用一二

錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

本草綱目

秦艽味苦辛氣溫無毒陰中微陽可升可降入手足

陽明經

李時珍曰出飛鳥山谷及甘肅龍洞渭州鄭州岐州諸處枝幹高五六寸葉婆娑如蒿苣

葉莖梗俱青

六月開花紫色似葛花當月結子根黃白色長尺許作羅紋交糾其文左列者佳右列者次

之白

春秋二季采根陰乾拭去黃白毛用紋中多土宜洗去○秦艽清熱去濕祛

風利養血榮筋之藥也散風寒濕邪療五疽蒸熱而

發黃通筋骨絡脉去痿痺寧急之疼痛又止腸風藏

毒痔血白帶寒熱骨蒸等證統屬陽明一經之病也

蓋陽明有濕則身體煩疼陽明有熱則日晡潮熱膏

蒸陽明有風則腸澼痔血寒熱淋帶秦艽專入陽明

故盡能去之○盧不遠先生曰人身直者爲經橫者爲絡絡之下注者爲孫肌腠之邪多從孫入次薄于絡復溜于經漸傳于藏秦艽羅紋交糾錯綜如織象形從治法也○沈則施先生曰秦艽味苦辛溫感秋金之氣故入手足陽明經若能洩辛能散溫能通故主寒熱邪氣濕熱黃疸腸紅痔帶或機關不利爲痿爲蹙爲縱爲攣爲麻爲痛而諸因濕因熱因風者一併除之凡病陰虛血燥精竭髓衰之證非配大滋養藥不可○集方治風寒濕熱鬱蒸成黃疸用秦艽茵

陳各五錢煎服○治風寒濕熱壅閉經絡成痿痺癱
瘓諸疾用秦艽蒼朮米泔浸晒乾各四兩葶藶黃柏
羌活當歸紅花各二兩分作十劑水煎服○治骨蒸
夜熱用秦艽地骨皮各三錢水煎服本草
彙言

秦艽生秦地根皆作羅文相交故以名之味苦辛平
微溫無毒

主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無
問久新通身攣急○根土黃色而相交糾長一尺已

來窺細不等中多銜
土用之破開除去雷公云凡使秦艽須於脚文
處認取左文列爲秦

卽治疾艽卽發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉本草
毛盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用之原始

秦艽味苦辛氣平微溫可升可降陰中陽也無毒入

大腸之經養血榮筋通利四肢能止諸痛通便利水
散黃疸又止頭風解酒毒療腸風下血但小有補益
終非君藥前人稱其能去骨蒸傳尸此乃所不敢信
也○或問秦艽散風邪之品前人稱其能去骨蒸傳
尸而吾子不敢信使人疑信相半幸爲我論之曰骨
蒸癆瘵之漸也內無真陰之氣以沖養其骨中之髓
故夜發熱而日不熱也且夜熱之時熱在骨中肉皮
之熱反輕此非外有邪犯又非邪入骨中乃精自內
空必須填補真陰少加退陰火之味始能秦艽止能

散內風病既無風用之不益如內熱乎傳尸之症乃
癆瘵之已成也內生□虫食人精血以致咳嗽不已
且事補陰尚難奏効况益之以散風利水之藥以重
其用乎此余之所不敢信又天下人之所宜共信余
言者也

本草
新編

秦艽

產家大器

秦艽

事物
異名

秦艽

占全莖性平微溫

一云
冷

味苦辛無毒主風

寒濕痺瘵風無問久新通身癢急肢節痛瘵酒黃黃
疸骨蒸利大小便○一名秦艽生山中根土黃色而

相交糾長一尺以來葉青如萵苣葉六月開花紫色

似葛花當月結子二月八月採根暴乾須用新好羅

文者佳

本艸

○手陽明經藥也治腸風瀉血去陽明經

風溼水洗去土用之

湯東醫液寶鑑

秦艽 苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝膽之氣養

血榮筋

風藥中潤劑散藥中補劑

治風寒濕痺

經曰風寒濕三氣雜至而為痺風勝

為行痺寒勝為痛痺濕勝為着痺痺在于骨則體重在脉則血滯在筋則拘攣在肉則不仁在皮則寒

通身掣急

血不榮筋

虛勞骨蒸

時珍曰手足陽明經藥兼入肝胆陽明有濕則手足

酸痛寒熱有熱則日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡各一兩甘草五錢為末每服三錢治小

兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦艽炙甘草各一兩每服一二錢錢乙加薄荷五錢痘黃酒毒腸

風瀉血口噤牙痛

齒下齩屬手陽明大腸經張潔古曰秦艽能去下牙痛及本經風濕

濕勝風淫之症利大小便

牛乳點服原治黃疸煩渴便赤形作羅紋

相交長大黃白左紋者良菖蒲爲使畏牛乳

增訂本草備要

秦艽感秋金之氣陰中微陽可升可降又肝膽大腸

胃四經日華治骨蒸及疳熱甄權治酒疸解酒毒元

素除陽明風溼及手足不遂腸風瀉血咸以其除溼

散結清腸胃之功也同葛根茵陳五味黃連菟豆

水通治酒疸同薏苡水瓜五加皮黃蘗蒼朮牛膝

治下部溼熱作疼或生溼瘡下部虛寒人及小便

不禁者勿服

本草經疏要

秦艽 秦瓜 本草綱目秦艽本名秦紕又名秦瓜

產家大器 清異錄侯寧極藥譜產家大器秦艽

也

事物異名錄

秦真濁 慈鄰切盡平聲永名○周伯溫曰秦地宜永

故从永○艽又清居肴切音交秦艽藥名

字彙

秦慈盈切盡平聲永名又國名初伯益佐禹治水有

功賜姓嬴氏其後非子事周孝王養馬于汧渭之間

馬繁息封爲附庸而邑之秦今陝西鞏昌府秦州是
○說文秦地宜禾从禾从會省一曰秦禾名篆作𥝌
籀从秝篆作𥝌舊註引周伯溫說不知正譌本說文
也又禾類雖不一土各有宜四方皆徧莧之非獨秦
也說文專屬秦泥○芄居宵切音交秦芄黃色相交
糾枝幹高五六寸葉連莖青色花紫禾根入藥出秦
中治寒溼風痺骨蒸諸症俗作秦膠雷斅炮炙論須
于脚文認取左文列爲秦治疾右文列爲芄卽發脚
氣不知秦芄但以左文者爲良非有二種分秦與芄

爲二名誤今方音讀鳩非

正字通

秦古文森唐韻廣韻匹鄰切集韻類篇韻會正韻慈

隣切並音榛國名尤唐韻集韻韻會並巨鳩切音求

又廣韻正韻竝居肴切交秦尤藥名本草出秦中以

根作羅紋交糾者佳故名

康熙字典

增本草綱目秦艽一名秦統一名秦瓜

蘇恭云俗作秦膠本名秦

紉與糾同李時珍曰出秦中蘇頌曰河陝州郡多有

以根作羅紋交糾者佳故名之其根土黃色而相交糾長一尺以來蘗細不等枝

幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如蒿苳葉六月

中開花紫色似葛花當月結子每於春秋永根陰乾
李時珍曰以左文者爲良氣味苦平無毒治寒熱邪
氣寒濕風痺肢節痛骨蒸疔及時氣療黃疸解酒毒
去頭風瀉血養血榮筋益膽氣治胃熱手足陽明經
也兼入肝膽

廣翠
芳譜

秦艽其根土黃色而相交斜長一尺以來麓細不等
枝幹高五六寸葉婆婆連莖根俱青色如萵苣葉六

月開花結子

鐵輔
通志

秦艽本草云出齊州味苦辛平微溫無毒圖經云根

土黃色而相交糾長一尺許麓細不等枝幹高五六

寸葉婆娑青色六月開花紫色當月結子二八月採

根陰乾山東通志

秦艽和名土加利久左又稱波加利久左增補異名

秦紉唐本秦瓜蕭多識編

秦艽一名秦紉唐本一名秦瓜蕭本一名產家大器事物

異一名秦膠本草綱目秦艽膠味苦平主寒熱邪氣寒溫

風痺肢節痛下水利小便神農本草經秦艽辛微溫無毒

療風無久新通身攣急生瘰烏山谷二月八月採根

暴乾

梁陶弘景名醫別錄

凡使秦芫須於脚文處取左文列

爲秦卽治疾芫卽發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用

劉宋雷敷炮炙

論

陶隱居云飛鳥或是地名今出甘松龍洞蓋陵

長大黃白色爲佳根皆作羅文相交中多銜土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風常用道家不須爾唐本注云今出涇州郿州岐州者良本作紕或作糾作膠正作芫也臣禹錫等謹按藥性論云秦芫解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便

差五種黃病解酒毒去頭風蕭炳云本經名秦艸世
人以療酒黃黃疸大効日華子云味苦冷主傳尸骨

蒸治瘡及時氣又名秦爪羅紋者佳嘉祐補註本草秦艸

生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交
糾長一尺已來麓細不等枝幹高五六寸葉婆婆連
莖梗俱青色如蒿苣葉六月中開花紫色似蓴花當
月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩
熱口乾皮肉皆黃以秦艸十二分牛乳一大升同煮
取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元

亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得
快利三五行卽差法並同此又治黃方用秦艽一大
兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取
汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡
黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞
發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是
元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文
者宋蘇頌圖
經本草恭曰秦艽俗作秦膠本名秦紉與紉
同明李時珍
本草綱目秦艽始出飛鳥山谷今河陝州郡多

有之其根土黃色而相交糾長一尺已來麓細不等
 枝幹高五六寸葉婆婆連莖梗俱青色如萵苣葉六
 月中開紫花似萵當月結子每于春秋采根陰乾以
 出秦中根作羅紋交糾者佳故因名秦苣氣味苦平
 無毒

明李中立
本草原始

秦苣李時珍曰出飛鳥山谷及甘

松龍洞涇州鄜州岐州諸處枝幹高五六寸葉婆婆
 如萵苣葉莖梗俱青六月開花紫色似萵花當月結
 子根黃白色長尺許作羅紋交糾其文左列者佳右
 列者次之每于春秋二季采根暴乾拭去黃白毛用

紋中多土宜洗去

清倪朱謨本草彙言

秦艽一名產家大器

一名秦爪

明余國用事物異名

艽居宵切音交秦艽黃色相

交糾枝幹高五六寸葉連莖青色花紫赤根入藥出

秦中治寒溼風痺骨蒸諸症俗作秦膠雷敷炮炙論

須于脚文認取左文列爲秦治疾右文列爲艽卽發

脚氣不知秦艽但以左文者爲良非有二種分秦與

艽爲二名誤今方音讀鳩非又尤韻音求埤蒼曰遠

荒地詩小雅至于艽野一曰獸蓐

清廖綸璣正字通

秦艽

其根土黃色而相交糾長一尺已來麓細不等枝幹

高五六寸葉婆婆連莖根俱青色如蒿苴葉六月開

花結子

續輔增補庶
通志物類纂

秦艽苦平以左文者爲良破開除土去蘆以溼布拭
淨日乾用菖蒲爲使畏牛乳○人或取猫草根當秦

艽非是

本草
喉襟

エビ子 花黃白褐色數種アリモトハ山ニ生ス

三月花ヒラク陰地ヲ好ム宜黃土魚汁ヲソ、グ

ベシ好事ノ者盆ニウヘテ花ヲ賞スコレヲ藜蘆

ナリト云人アリ非ナリ

大和
本草

秦苳 秦紉 秦瓜 和名都加里久佐 一云波

加里久散 本綱秦苳生山谷其根上黃色而相交

糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆婆連

莖梗俱青色如蒿苳葉六月中開花紫色似葛花當

月結子其根羅紋相交者佳氣味苦辛陰中微陽

可升可降入手陽明經兼入肝膽故手足不遂黃疽

煩渴之病須之取其去陽明之濕熱也陽明有濕則身體酸

疼煩熱有熱則也菖蒲爲之使△按秦苳往昔本朝

日賄潮熱骨蒸倭漢三才圖會

他偷草

花形鈴ノゴトクサガル故ニ鈴フリ草

氏イフ色ウス黄葉ハ白ランノゴトシ近曾相州

ノ在郷ヘマカリシニ農家ニ此草植テアリ名ヲ

問待レバカマガニサウト申シキコレモ鈴フリ

ノ心カ花黄色ナルハナンキンエビ子トモ云

フ増補地
錦抄

秦苳釋名李挺曰生秦地而形相交也修治去蘆頭

洗土氣以布拭去黄白毛判用生絞者佳新者可解

用也氣味苦辛微温無毒能入大腸胃二經祛風活

絡養血舒筋骨蒸黃疸利小便中風恒用之者治風

先治血血行風自滅之意乎

修治

本書ノ如シ本書

ニ左絞ト云ハ根ガ一ツニナリテ子ジレテヲル

モノソレガ左子ジニナリテヲルモノヨシトス

能

本書ノ如シ此藥風濕ヲ去ル藥ニノ筋ノヒキ

ツルヲ目^ノ當^{フテ}トノ用ベシ○薏苡仁五加皮黃栢蒼

朮牛膝ト同用ノ下部ノ濕熱ニ因テ或ハ痛三或

ハ濕瘡ヲ生スルニヨシ

毒

血氣不足虛寒小便清

利スルモノニ勿用

片玉六
本草

秦艸

漢アリ和ナシ

産家大器

秦用藥
須知

秦艸

唐ヨリ來ルヲ真トス艸ト云字義ハ根ノ

子デレタルヲ云ナリ左ト右ニ子デレテ糾索ノ

如シ此方ニナシ 別本猩々袴ニ當ルモ不可ナ

リ本草
會誌

照任曰奥州南部遠野ト云フ所ニ萬苣葉ノ秦艸

ヲ産ス其花葛ノ花ノ如紫色ナリ即チ官園ニ納

ム○先生按ズルニ萬苣葉ノ秦艸トイフハ猩々

袴ト云フ草ノ一種ナリ根ノ形チ左右ヘ子ジレ

タル物ナリ張璐力醫道ニ曰左ニ子ジレタルヲ
秦トシテ濕病ニ用エル時ハ脚氣ヲ發ス慎テ用
エルヲナカレト云ヘリ

採藥
使記

鰕エビ根子

一名鈴振草一名竈神草カミミナ葉似白芨而布地

生三四月抽莖開花肉紅色或淡黃或柳色或外褐

肉白或外紫內黃或樺色或外青肉白者名吾須手

或淡紫者名出船フナ性宜陰處冬亦不凋根圓似烏茈

而根有髭故名蝦根疑此藜蘆也然自古以萬年青

爲和藜蘆

物品
目錄

秦艽 葉ノ形頗烏頭葉ニ類シ花亦烏頭花ニ似
タリ根黃白色ニノ羅文アリ○朝鮮產上品享保
中種ヲ傳フ花黃白色又紫花ノモノアリ○日光
產上品黃白花ノモノアリ紫花ノモノアリ○信
濃產上品花紫色ナリ物類
品薦

秦艽 ハカリグサ和名
鈔 ツカリグサ同上 一名 產

家大器輟耕
錄 網草村家
方 漢渡アリ根肥大ニノ

黃白色左子デ右子デアリ又枝分レテ子デレ其
末合テ一本トナリテ子デレタルモアリ本根内

ハ空シクメ外ノミ網ノ如クナリテ求ハ子ヂレ
タルモアリコレヲ羅紋交糾ト云享保年中朝鮮
ノ秦艽ノ苗來ルソノ後種ヲ傳テ今多クアリ葉
ハ毛茛ムナシカタノ葉ニ似テ毛ナシ一根ニ叢生ス方莖直
立シテ葉互生シ淡黃花ヲ開ク形烏頭花ニ似テ
小シ根黃黑色ニメ形子ヂレタリ此草ハ城州ノ
北山及野州信州甲州ニ多シ花淡紫色ナリ又黃
白花モアリ種樹家ニテ伶人草ト云此根ハ漢渡
ノ乾シタル秦艽根ニヨク似テ黑褐色ナリ皮ヲ

去レバ色白ク内空虚ニノ羅紋交糾ス味苦ク莖
シ享保年中漢渡秦苧ノ中ニ偶其葉雜リ來ルア
リソノ形蘘荷ノ葉ニ似テ毛莨葉ノ形ニ非ス舶
來ノ蘆頭ヲ見ニ藜蘆葉ノモノト見ユ綱目藜蘆
ノ條下ニ韓保昇曰葉似鬱金秦苧蘘荷トコレニ
據テ觀レバ朝鮮種ノモノハ真ノ秦苧ニ非ズ牛
扁ノ集解ニ根似秦苧トアレバ牛扁根モ羅紋交
糾ナルヲ知ルベシ或説ニ朝鮮種及ビ伶人草共
ニ牛扁ナリト云此説從フベシ牛扁ヲゲンノセ

ウコニアツル古説ハ穂ナラズゲンノセウコハ

牻牛兒

救荒本草

ノ一種也

本草綱目啓蒙

秦艽

ハカリグサ

比叡山及大原道傍ニ多ク

アリ其苗葉附子烏頭

トリス

及牛扁

シラカ

石龍芮

ノタ

グヒニ

似タリ高サ尺餘ヒ八月淡紫花ヲヒラク形烏頭

ノ花ニ似テ稍小ナリ其根羅紋交糾ヲナス一種

黃花ヲ發ク者アリ

花景

秦膠

秦艽ナリ

肘後方○
藥名考

産家大器

ジンゲウナリ○秦艽

ジンゲウナ

リ○秦爪 ジンゲウナリ○秦膠 ジンゲウナ

リ○秦苳秦ハカリグサ トガリグサ 唐藥

ナリ藥品手
引草

秦苳 九輪草或ハ狸々袴ヲ以テ充ルハ非ナリ

千金方藥註

秦苳 用藥須知和ナシト云近世和産アリ真ナ

リ然氏藥店未嘗漢渡ノミ用之本草
正誤

秦苳 和名 ツガリグサ本草和名今何
物ヲ云歟不詳 ハカ

リグサ同上 和産ナシ蘭山云舶來ノモノ根肥大

ニノ黄白色左子ダ右子ダアリ又枝分レテ子ダ
レ其求合テ一本トナリテネジレタルモアリ本
根内ハ空シクシテ外ノミ網ノ如クナリテ求ハ
子ダレタルモアリコレヲ羅紋交糾ト云享保年
中朝鮮種ノ秦苳ノ苗來ルソノ後種ヲ傳テ今多
クアリコレ牛扁ニシテ秦苳ニ非スト云
云ソノ

朝鮮種ト云モノハ俗ニ伶人草ト云又丹州ニン

ジン人參キブ子アフヒ凡云野州足尾山甲州等

ニ自生アリ春宿根ヨリ生ズ葉ハゲンノセウコ閩牛兒苗及烏

本草通串
頭葉ニ似テ斑點アリ秋月莖高サ二三尺梢ニ穂
ヲナシ花ヲ開ク烏頭ノ花ノ形ニ似テ瘡小白花
ニシテ淡紫ヲ帶ブ又黃色ヲ帶ルモアリ根ノ形
大ナルハ小兒ノ手ヲ開キタルヤウナリ黃白色
味苦ク莖シ羅紋ヲナス一秦艽根ニ似タリ然レ
氏藜蘆ノ條下ニ韓保昇曰葉似鬱金秦艽藜蘆ト
云ヲ視レバ伶人草ノ葉烏頭ノ形ヲナスニ異レ
リコレニ因テ或説ニ牛扁トスルハ確言也又牛
扁ノ集解ニ根似秦艽ト云ヲ證トスベシ今處々

藥園ヨリ作り出ス秦艽ハ皆伶人草ナリ宜ク船

來ノモノヲ藥用ニスベシ

本草
穿要

ツカリグサ
都加里久佐

秦艽
和名鈔

○ハカリグサ
波加里久佐

秦艽
和名鈔
草本

藥名備考
和訓鈔

エビ子

漢名未詳
同上

附子葉秦艽

葉形相似テ淡綠色一面白斑點ア

リ草立一尺餘根羅紋ノ附子ト異リ花形毛相似

テ黃白色又紫花アリ葉綠色ニノ斑點ナシ日光

及信州ヨリ來ル

百花天
工區別

エビ子 スミフリ花 カマガ三草 花ノ色種
種アリテ同ジカラズ色ニシタガヒテ俗名多シ
又夏花咲モアリ秋花有モアリ大テイ白茺シラシニ似
テ葉ヒロク短シ立筋多シ花莖ヲ葉ニテ包メル
ガ如シ花莖白及トハ違ヒ太クシテタレズ花段ダ
ヲナシテ數ツクナリ 四季賞
花集

秦艽 舶渡長大黃白左紋交糾者當爲真也徃歲
所傳從朝鮮者其葉正類牛扁 昔時藍水先生決爲
牛扁近來亦有取此
說今 官園養之或云韓保昇注藜蘆云葉似鬱金
者

秦艽 藁荷 据此說則秦艽葉不似牛扁也因意清商
以稱猩猩袴者倣土秦艽所謂猩猩袴亦與牛扁殊
矣尚俟考博焉 本草綱目纂疏

ジンギヤウ ハカリグサ 秦艽 和産未詳品

識名
松遺

秦艽 根 舶來一品真ナリ 和産ナシ今種樹家ニ

テ秦艽ト云モノハ牛扁ナリ 日用藥品考

ハカリ 秦艽 秦艽 網草 和産ナシ享保年中渡ル秦


艽中ニ其葉雜リ來ルアリ形ハ藁荷ノ葉ノ如シ

本草通串

手板
發蒙

本草通串卷四十一

本草通串卷四十二



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

茈胡

茈胡味苦平主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱

邪氣推陳致新久服輕身明目益精一名地薰

神農本草經

○大觀
本草

本草經曰茺藟一名地薰味辛平生川谷治心腹祛

腸胃結氣久服輕身明目益精生宏農

神農本草經
太平御覽

茺胡

本經上品

釋名

地薰

本經

主治

心腹腸胃中結氣飲食

積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精

本經神農

本經
草綱目

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣

推陳致新久服輕身益精

神農本草經
湯液本草

茺胡味苦平主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪

氣推陳致新久服輕身明目益精

地薰

神農本草經
盧復手

錄

柴胡味苦平主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪

氣推陳致新

神農本草經疏
○吳懷祖輯要

芫胡味苦平主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱

邪氣推陳致新久服輕身明目益精

神農本草經
○百種錄

芸蒿似邪蒿可食

倉頡
解詁

芫胡微寒無毒除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中

邪氣五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可

作浴湯一名芸蒿辛香可食生洪農川谷及兗甸二

月八月採根暴乾

名醫別錄
大觀本草○

芫胡釋名

芸蒿

別錄

集解

別錄曰

芫胡葉名芸蒿辛香

可食生弘農川谷及宛句二月八月采根暴乾氣味

別錄曰微寒

主治

除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸

中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦

可作浴湯

別錄名醫別錄
本草綱目○

除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胃中邪逆五臟間遊

氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯

名醫別錄
○湯

液本
草

莼 莼艸也从艸此聲將此切 **胡** 牛顛座也从肉古聲

戶孤切 說文

吳氏本草經曰莼蒟一名山來一名如草神農岐伯

雷公苦無毒生冤句二月八月採根 吳普本草太平御覽

釋名 山菜 吳普 茹草 吳普 **氣味** 普曰神農岐伯雷公苦无

毒 吳普本草本草綱目

陶隱居云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿

葉似邪蒿春秋有白蒟 音弱 長四五寸香美可食長安

及河內並有之此莼胡療傷寒第一用 神農本草陶弘景注 ○大

觀本
草

集解 弘景曰今出近道狀如前胡強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒿長四五寸香美可食長安及河內並有之

神農本草陶弘景注○本草綱目

雷公曰凡使莖長軟皮赤黃髮鬚出在平州平縣平州卽今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是紫胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去鬚并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以籠布拭了細剉用勿令犯火立便無效也

炮炙論○大觀本草

集解 數曰茈蒟出在平州平縣卽今銀州銀縣也西

畔生處多有白鶴綠鶴于此飛翔是茈胡香直上雲

間若有過徃聞者皆氣爽也〔根〕修治 數曰凡求得銀

州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄皮少許以粗布

拭淨剉用勿令犯火立便无效也

炮炙論
本草綱目

得茈苓桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮

取四升入消石二方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩

滿半夏爲之使惡皂莢畏女茈藜蘆

藥對○大
觀本草

煎汁之才曰半夏爲之使惡皂莢畏女茈藜蘆發明

本草通串

之才曰芫胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水
一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛

心下煩滿

藥對○本草綱目

半夏爲之使惡皂莢畏女苑藜蘆

藥對○湯液本草

芫胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣
勞乏羸瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服

良

藥性論○大觀本草

治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消
食宣暢氣血主時疾內外熱不解單煮服之良

甄權藥性

論○本草綱目

柴胡君為味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲

食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰

熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大腸停積水脹及濕

痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰

一名山萊一名茹草葉名芸蒿辛香可食生弘農川

谷及宛句二月八月採根暴乾千金翼方

苗主治卒聾擣汁頻滴之千金方○金本草綱目

唐本注云茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云茈

本草通串
二
音莛草並作莛字且此草根紫色今太常用莛胡是

也又以水代系相承呼爲莛胡且檢諸本草無名此
者傷寒大小莛胡湯最爲痰氣之要若以芸蒿根爲
之更作莛音大謬矣

唐本注
大觀本草

釋名

恭曰莛是古柴字上林賦云莛薑及爾雅云莛

草並作此莛字此草根紫色今太常用莛胡是也又
以水代系相承呼爲柴胡且檢諸本草无名此者集
解恭曰傷寒大小柴胡湯爲痰氣之要若以芸蒿根
爲之大謬矣

唐本注
本草綱目

蕭炳云主痰滿胸脇中痞四聲本草○
大觀本草

陳藏器云陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫薑作紫

色此草紫色上林賦云茈薑太常用茈胡是也本草拾遺

○大觀
本草

倉頡解詁云芸蒿似邪蒿可食續博物志

茈胡蘇敬注云茈是古紫字也一名地薑一名山菜一名茈草

葉一名芸蒿白蒿陶景注茈胡也仁謂音茈薑 菹茈 茈草

蘇敬注云一名山梨出雜要訣和名乃世利 一名波

末阿加李本草和名

臣禹錫等謹按藥性論云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消食主時疾內外熱不解單煮服良

蜀本草掌禹錫按○大觀本草

𦵏茈草也從艸此聲臣鍇曰卽今染柴草也司馬相

如上林賦書茈藿字如此津矣反胡牛領亟也從肉

古聲臣鍇曰牛領下無皮也言宛曲也魂徒反

說文解字

通釋

尾張國茈胡十二斤○美濃國茈胡十斤○丹波國

茈胡十二斤○播磨國茈胡十斤○安藝國茈胡六

斤○阿波國一斤延喜式

茈胡 本草云茈胡和名乃世里一云阿末安加奈

蘇敬注云茈古紫字也和名類聚鈔

日華子云味甘補五勞七傷除寒止驚益氣力消痰

止嗽潤心肺添精補髓天行瘟疫熱狂之絕胃脇氣

滿健忘日華本草○
大觀本草

氣味大明曰甘主治補五勞七傷除煩止驚益氣力

消痰止嗽潤心肺添精髓健忘大明○
日華子
本草綱目

別說云謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二

尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

本草別說
大觀本草

集解

承曰柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺

香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地方多沙同華亦沙

苑所出也

本草別說
本草綱目

圖經曰柴胡生洪農山谷及宛句今關陝江湖間並道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉

似竹葉稍紫亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此爲最要之

藥

圖經○大
觀本草

集解頌曰今關陝江湖間迺道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者

七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青
子與他處者不類其根似前胡蘆頭有赤毛如鼠尾
獨窠長者好發明張仲景治傷寒有大小柴胡及柴
胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此爲最
要之藥

蘇頌圖經○
本草綱目

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴
胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此爲最要之藥

○湯液
本草

丹州柴胡

襄州柴胡

淄州柴胡

江寧府柴胡

銀州柴胡

二月八月備急本
採根暴乾草圖拔

茈胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎丸用茈胡正合宜耳服之無不効熱去卽煩急已若或無熱得此愈甚雖至死人不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬

世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自可處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

本草衍義

○丹波元胤訂
正重雕宋本

衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡誤世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜耳服之無不效熱去卽須急已若或無熱得此愈

甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞
七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱
醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽
蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自可處治
中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉
如張仲景治寒熱往來如瘧疾用柴胡湯正合其宜
本草衍義○
大觀本草

發明宗奭曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方
中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一

種其臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也
當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎丸用柴
胡正合宜爾服之無不效熱去卽須急止若或無熱
得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂
補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟
無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦
不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景
治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜也

本草衍義
○本

衍義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真藏虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如

本草通串

張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

本草衍義○湯

液本

芫胡曰地蕪曰山萊曰茹草葉曰芸蒿辛香可食生

於銀夏者芬馨之氣射於雲間多白鶴青鶴翱翔其

上昆蟲草
水畧

珍云去來寒熱膽痺非此不能除

張元素珍珠囊
○湯液本草

氣味元素曰氣味俱輕陽也升也少陽經藥引胃氣

上升苦寒以發散表熱**主治**除虛勞散肌熱去早辰

潮熱寒熱往來膽痺婦人產前產後諸熱心下痞胸

脇痛

元張元素○
素本草綱目

象云除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後
必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胃
膈痛去蘆用心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒
以發表熱東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥
所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升
騰而行春令是也欲其如此又可加之
李東垣藥類
法象○湯液

草本

柴胡

半夏爲之使惡阜
莢畏女苑藜蘆

味苦平性微寒無毒升也陰

中之陽也其用有四左右兩傍脇下痛日晡潮熱往
 來生在藏調經內主血在肌主氣上行經手足少陽
 表裏四經之藥也柴胡去熱治勞傷主療傷寒功力
 到柴胡味苦平辛微寒無毒治濕痺拘攣可用煎湯
 浴之下氣消痰止嗽傷寒爲要藥前胡柴胡功無優
 劣通醫熱病主療傷寒柴胡黃連瀉肝膽火李杲藥性賦
 氣味杲曰升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經
 藥也在臟主血在經主氣欲上升則用根以酒浸欲
 中及下降則用稍發明能引清氣而行陽道傷寒外

諸有熱則加之也又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡諸瘡以柴胡爲君隨所發時所在經分佐以引經之藥十二經瘡疽中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與連翹同也

李杲○本草綱目

柴胡 氣平味微苦微寒氣味俱輕陽也升也純陽無毒

本草云入足少陽主東方分也在經主氣在藏

主血證前行則惡熱却退則惡寒雖氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老

俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮
輩同爲調經之劑海藏云能去藏腑內外俱乏既能
引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之□
爲嫩陽故以少陽當之

湯液
本草

發明好古曰柴胡能去藏腑內外俱乏既能引清氣
上行而順陽道又入足少陽在經主氣在臟主血前
行則惡熱却退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能
行經若佐以三稜廣茂巴豆之類則能消堅積是主
血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴

胡湯加以四物之類并秦艽牡丹皮輩爲調經之劑
又言婦人產後血熱必用之藥也

王好古○
本草綱目

蘆頭豹子

柴駢香
胡儷艷

柴胡 一名地薰一名山茱一名茹草葉一名芸蒿

生弘農川谷及冤句壽州淄州關陝江湖間皆有銀
州者爲勝今鈞州密縣山谷間亦有苗甚辛香莖青
紫堅硬微有細線楞葉似竹葉而小開小黃花根淡
赤色味苦性平微寒無毒半夏爲之使惡皂莢畏女
菀藜蘆又有苗似斜蒿亦有似麥門冬苗而短者開

黃花生丹州結青子與他處者不類 救飢 採苗

葉燂熟換水浸淘去苦味油塩調食

救荒本草
農政全書

梁胡一名地薰一名山萊茹草葉一名芸蒿生弘農

川谷及宛句秦州淄州關陝西江湖間皆有銀州者

爲勝今鈞州密縣山谷間亦有苗甚辛香莖青紫堅

硬微有細線楞葉似竹葉而小開小黃花根淡赤色

味苦性平微寒無毒半夏爲之使惡阜莢畏女菀藜

蘆又有苗似斜蒿亦有似麥門冬苗而短者開黃花

生丹州結青子與他處者不類 救飢 採苗葉燂熟換

水浸淘去苦味油塩調食治病

具見救荒本草
本草古今醫統

柴胡味苦氣平微寒氣味俱輕升也陰中之陽無毒

州土各處俱生銀夏

州名屬陝西

出者獨勝根鬚長如鼠

尾一二尺餘香氣直上雲端有鶴翔集八月採折

淨蘆頭療病上升用根酒漬中行下降用梢宜生畏

女苑藜蘆使半夏一味乃手足少陽厥陰四經行經

藥也瀉肝火去心下痰結熱煩用黃連

猪膽

爲佐治

瘡瘍散諸經血凝氣聚與連翹同功□□□胸脇

刺疼及膽痺疼痛解肌表熱早晨潮熱併寒熱往來

傷寒門實爲要劑溫瘧證誠作主方且魁濕痺拘攣
可作濃湯浴洗在臟主血在經主氣亦婦人胎前產
後血熱必用之藥也經脉不調加四物秦艽牡丹皮
治之最効產後積血佐已豆三稜蓬莪茂攻之卽安
又引清氣順陽道而上行更引胃氣司春令以首達
亦堪久服明目輕身○葉名芸蒿辛香可食護按衍
義云本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用
誤世甚多嘗原勞症雖有一種真臟虛損復受邪熱
熱因虛致故曰勞者牢也亦須斟酌微加熱去卽當

急已也設若無熱得此愈增經驗方治勞熱青蒿煎
九少佐柴胡正合宜爾故服之無不効者日華子竟
信爲實就註本經條下謂補五勞七傷除煩而益氣
力藥性論又謂治勞乏羸瘦是皆不智妄自作偏者
也若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待本
草註釋豈可半字鹵莽耶萬世之後所誤無窮誰之
咎也明達之醫固知去取中下之士寧不蹈其轍哉
非比仲景治傷寒寒熱往來如瘧之證製夫大小柴
胡及加龍骨柴胡加芒硝等湯此誠切要之藥萬世

之所宗仰而無罅議者也

本草
蒙筌

柴胡味苦性微寒無毒入肝膽心包絡三焦胃大腸
六經主傷寒心中煩熱痰實腸胃中結氣積聚寒熱
邪氣兩脇下痛疏通肝水推陳致新半夏爲使惡皂
莢畏女菀藜蘆犯火無功 按柴胡氣味升陽能提
下元清氣上行以瀉三焦火補中益氣湯用之亦以
其能提肝氣之陷者由左而升也凡胃腹腸胃之病
因熱所致者得柴胡引清去濁而病謝矣故入肝膽
等經衍義曰本經並無一字言及治勞今治勞多用

之誤人不小勞有一種真臟虛損復受邪熱邪因虛而致勞者宜用後世得此數言凡遇勞症槩不敢用此所謂休儒觀場隨衆喧喝矣惟勞症不犯實熱者用之亦能教人誠所當慎咳嗽氣急痰喘嘔逆者禁用以其上升也傷寒初起忌之恐引邪入少陽經也

雷公云

凡使莖長軟皮赤黃髭鬚出在平州平縣卽今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠

鶴於此翔處是紫胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去髭并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以粗布拭淨細剉用之

註云

紫胡乃少陽經藥也久服令人肝膽平

鵝補雷公炮製藥性解

茈胡釋名時珍曰茈字有紫紫二音茈薑茈草之茈

皆音紫茈胡之茈音紫茈胡生山中嫩則可茹老則

采而爲紫故苗有芸蒿山茱茹草之名而根名紫胡

也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作茈字

也集解時珍曰銀州卽今延安府神木縣五原城是

其廢蹟所產紫胡長尺餘而微白且軟不易得也北

地所產者亦如前胡而軟今人謂之北紫胡是也入

藥亦良南土所產者不似前胡正如蒿根強硬不堪

使用其苗有如韭葉者竹葉者爲勝其如邪蒿者最

下也按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云芸
蒿也似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭
以爲非柴胡云近時有一種根似桔梗沙參白色而
大市人以偽充銀柴胡殊无氣味不可不辨氣味苦
平無毒時珍曰行手足少陽以黃芩爲佐行手足厥
陰以黃連爲佐主治治陽氣下陷平肝膽三焦包絡
相火及頭痛眩運目昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘡及肥
氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹餘熱五
疳羸熱

時珍

發明

時珍曰勞有五勞病在五臟若勞在

肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥惟勞在肺腎者不用可爾然東垣李氏言諸有熱者宜加之無熱則不加又言諸經之癰皆以柴胡爲君十二經瘡疽須用柴胡以散結聚則是肺癰腎癰十二經之瘡有熱者皆可用之矣但要使用者精思病原加減佐使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴胡不治勞之一槩擯斥殊非通論如和劑局方治上下諸血龍腦雜

蘇九用銀柴胡浸汁熬膏之法則世人知此意者鮮
矣按龐元英談藪云張知閣久病癰熱時如火年餘
骨立醫用葷附諸藥熱益甚召醫官孫琳珍之琳投
小柴胡湯一帖熱減十之九三服脫然琳曰此名勞
癰熱從髓出加以剛劑氣血愈虧安得不瘦蓋熱有
在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只
須一服南方者力減故三服乃效也觀此則得用藥
之妙的矣寇氏之說可盡憑乎

本草綱目

柴胡味苦寒無毒氣味俱輕陽也升也入手足少陽

厥陰四經欲上升則用根欲下降則用梢蘇氏曰柴胡出弘農

川谷及冤句今關陝江湖近道亦有以銀州者爲勝
銀州卽寧夏衛也十一月根生白蘗香美可食二月
苗長莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小亦
有似邪蒿者亦有似麥門冬葉而稍短者七月開黃
花根淡赤色似前胡而強硬如柴故名柴胡惟丹州
者結青子與他處不同其根似蘆頭有赤毛如鼠尾
獨竄而長者佳生處香氣直上雲間多有白鶴飛翔
人有過其圃者聞之皆氣爽也李氏曰銀州者根長
尺餘微白而軟皮皺肉有黃紋不易得也治虛勞骨
蒸最妙北地所產者如前胡而強謂之北柴胡治傷
寒解半表半裏之邪最妙南土所產者不似前胡有
似蒿根強硬不堪用最下也○近時有一種根似桔
梗沙參白色而大市人僞充○柴胡能條達肝氣升
銀柴胡殊無氣味不可不辨

清降濁之藥也解傷寒清少陽半表半裏之邪調血

氣疎肝膽已結未結之疾其味苦寒可以清熱其性輕揚可以散邪故治少陽傷寒寒熱往來口苦嘔逆胸脇滿悶頭角作痛等證或溫瘧瘧瘧邪熱不清或邪陷陰中日晡發熱又治婦人熱入血室譫語妄見并經水不調寒熱交作又治小兒五疳羸熱能食而瘦痘後餘熱兩眼赤爛等證悉用柴胡治之因其味之苦寒而散性之輕揚而達能發越屈曲不正之氣也前人又謂治勞熱若勞熱在肝膽心及胞絡三焦脾胃者用之有驗若勞熱在肺腎者用之無益耳病

人元虛而氣升者嘔吐及陰虛火熾炎上者法皆禁忌○朱東生曰柴胡少陽厥陰主藥輕清而升苦寒而降散表邪除頭痛退寒熱止脇痛和表裏調血室明目疾升下陷降濁陰性惟疎散凡病肝鬱悶不平者服之最靈○倪朱謨曰柴胡有銀柴胡北柴胡軟柴胡三種之分銀柴胡出關西諸路色白而鬆形長似鼠尾北柴胡出山東諸路色黑而細密形短如帚軟柴胡出海陽諸路色黑而輕軟一名三種也氣味雖皆苦寒而俱入少陽厥陰然又有別也銀柴胡清

熱治陰虛內熱北柴胡清熱治傷寒邪熱也軟柴胡
清熱治肝熱骨蒸也其出處生成不同其形色長短
黑白不同其功用內外兩傷主治不同胡前人混稱
一物漫無分理日華子所謂補五勞七傷治久熱羸
瘦與經驗方治勞熱青蒿煎丸少佐柴胡言銀柴胡
也行義云本經並無一字治勞而治勞方中用之鮮
有不悞者言北柴胡也然又有真藏虛損原因肝鬱
血閉成勞虛因鬱致熱由鬱成軟柴胡亦可相機而
用如傷寒方有大小柴胡湯仲景氏用北柴胡也脾

本草綱目

二

虛勞倦用補中益氣湯婦人肝鬱勞弱用逍遙散青
 蒿煎丸少佐柴胡俱指軟柴胡也業醫者當明辨而
 分治可也○沈則施先生曰仲景治傷寒寒熱往來
 口苦耳聾胸脇痛而無汗設小柴胡湯同參半苓草
 又治少陽經正瘡并似瘡非瘡寒熱不時等病本草
 柴胡銀夏者佳狀如前胡強梗如柴故名味苦平微寒無毒主
 腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒
 心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大腸
 停積水脹及濕痺○銀柴胡形色黃白雷公云凡
 拘攣亦可作浴湯○多皺內有黃紋使
 莖長軟皮赤黃髭鬚出在平州平縣即今銀州銀縣
 也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是柴胡香直

上雲間若有過往聞者皆氣爽凡抹得後去髭并頭
用銀刀削上赤薄皮少許却以粗布拭澤細剉用之
勿令犯火立立本草
便無效也原始

柴胡味苦氣平微寒氣味俱輕升而不降陽中陰也
無毒入手足少陽厥陰之四經瀉肝膽之邪去心下
痞悶解痰結除煩熱尤治瘡瘍散諸經血凝氣聚止
偏頭風胸脇刺痛通達表裡邪氣善解潮熱傷寒門
中必須之藥不獨瘧症鬱症之要劑也婦人胎產前
後又宜用之目病用之又良但可爲佐使而不可爲
君臣蓋柴胡入于表裡之間自能通達經絡故可爲

佐使而性又輕清微寒所到之處春風和氣善於解
紛所以用之無不通也然世人正因其用無不宜無
論可用不可用動卽用之加陰虛癆瘵之類又終日
煎服耗散真氣內熱更熾全然不悟不重可悲乎夫
柴胡止可解鬱熱之氣而不可釋骨髓之炎也能入
于裡以補正能提氣以升于陽使參芪歸朮共健脾
而開胃不能生津以降於陰使麥冬丹皮益肺以滋
腎能入於血室之中以去其熱不能入於命門之內
以去寒無奈世人妄用柴胡以殺人也余所以深解

之耳○或問柴胡不可久用以治陰虛之人是矣然
古人往々襍之青蒿地骨皮麥冬之內每服退熱者
又謂之何曰此陰虛而未甚者也夫陰虛而火初起
者何妨少用柴胡引諸補虛陰之藥直入于肝腎之
間轉能瀉火之速所惡者重加柴胡而又久用不止
耳用藥貴通權達變豈可拘泥之哉○又問柴胡既
能提氣能補脾而開胃何以又有用之而氣上冲者
何故此正見柴胡之不可妄用也夫用柴胡提氣而
反甚者必氣病之有餘者也氣之有餘必陰之不足

也而血之不足者必陰之甚虧也水不足以制火而反助氣以升陽則陰愈消亡而火愈上達氣安得而不上冲乎故用柴胡以提氣必氣虛而下陷者殆可至于陰虛火動之症夫火正炎上又加柴胡以升提之火愈上騰而水益下走不或何待乎此陰虛火動斷不可用柴胡不更可信哉○或問柴胡乃半表半裏之藥故用之以治肝經之邪最效然而肝經乃陰藏也邪入于肝已入于裏矣又何半表半裏之足云乃往往用柴胡而奏效如神者何也夫肝經與膽經

爲表裏邪入于肝未有不入于膽者或邪從膽而入于肝而內留于膽彼此正相望而相通也柴胡乃散肝邪而又散膽邪之藥故入于肝者半而入于膽者又半也所以治肝而膽之邪出治膽而肝之邪又出也○或問柴胡既是半表半裏之藥邪入于裏用柴胡可引之以出于表則病必輕邪入于表又用柴胡倘引之以入于裏不病增乎不知柴胡乃調和之藥非引經之味也邪入于內者能和之而外出豈邪入于內者又和之而內入乎此傷寒汗吐下之病仲景

夫子所以每用柴胡以和解于半表半裏之間使反危而爲安撥亂而爲治也○又問柴胡既是調和之藥用之于鬱症者固宜然有時解鬱而反動火又是何故曰此必婦女鬱于懷抱而又欲得男子而不可得者也論婦女思男子而不可得之脉肝脉必大而絃出于寸口然其懷抱旣鬱未用柴胡之前肝脉必瀉而有力一服柴胡而瀉脉必變爲大而且絃矣鬱開而火熾非柴胡之過正柴胡之功仍用柴胡而多加白芍山梔則火且隨之而卽散矣○或問柴胡爲

傷寒要藥何子不分別言之曰傷寒門中柴胡之症甚多何條宜先言何條宜畧言乎雖然柴胡之症雖多而甚要在寒熱之往來邪居于半表半裏之言盡之矣用柴胡而顧半表半裏也又何悞用哉○或問柴胡開鬱男子有鬱又可用之乎蓋一言鬱則男婦盡在其中矣豈治男一法而治女又一法乎世人治鬱多用香附誰知柴胡開鬱更易於香附也○或問柴胡本是散風之味何散藥偏能益人此予之未解也蓋剋中不剋剋卽是生也柴胡入肝而性專剋水

何以剋水而反能生水蓋肝屬木最善者水也其次則喜風然風之寒者又其所畏水遇寒風則黃落葉既凋零而水之根必然下生而剋土矣土一受傷而胃氣卽不能開而入病似乎肝之不喜風也誰知肝不喜寒風而喜溫風也水一遇溫風則萌芽卽生枝葉扶疎而下不生根又何至剋土乎土受傷而胃氣輒開入病頓愈柴胡風藥中之溫風也肝得之而解鬱竟不知抑滯之氣何以消釋也故忘其性之相制轉若其氣之相宜剋旣不剋非剋之卽所以生之乎

剋卽是生剋非真剋生乃是剋生實非生全生于剋之中制剋于生之外是以反得其生之之益而去其剋之之損也○或疑柴胡用之補中益氣湯中爲千古補氣方之冠然吾以爲柴胡不過用之升提氣之下陷耳胡足奇此真不知補中益氣湯之妙也補中益氣湯之妙全在用柴胡不可與升麻並論也蓋氣虛下陷未有不氣鬱者也惟鬱故其氣不揚氣不揚而氣乃下陷徒用參歸芪朮以補氣而氣鬱何以舒發乎卽有升用以提之而脾胃之氣又因肝氣之鬱

來尅何能升哉得柴胡同用以舒肝而肝不尅土則土氣易于升騰方中又有甘草陳皮以調和于胸膈之間則補更有力所以奏功如神也是柴胡實有奇而非提氣之下陷一語可了使柴胡止提氣之下陷何風藥不可提氣而東垣先生必用柴胡以佐升麻之不及耶夫東垣先生一生學問全在此方爲後世首推蓋不知幾經躋度精思而後得之也豈漫然哉○或問大小柴胡湯俱用柴胡何以有大小之分豈以輕重分大小乎不知柴胡調和於半表半裏原不

必分大小也而仲景張夫子分之者以大柴胡湯中有攻下之藥故以大別之實慎方之意教人宜善用

柴胡也于柴胡何豫哉

本草新編

柴胡

地薰

芸蒿

茹草

山茱

事物異名

柴胡 性微寒

平一云

味微苦

甘一云

無毒主傷

寒寒熱往來天行時疾內外熱不解治熱勞骨節煩

疼除虛勞寒熱解肌熱早晨潮熱能瀉肝火除寒熱

往來瘧疾及胸脇痛滿○處處有之二月生苗甚香

莖青紫葉如竹葉亦似麥門冬葉而短七月開黃花

本草綱目

二月八月採根暴乾本草○足少陽厥陰行經藥也能

引清氣而行陽道又能引胃氣上行升騰而行春令

是也湯液○如鼠尾獨窠而長者好莖長軟皮黃赤者

佳忌犯銅鐵外感生用內傷升氣酒炒有咳汗者蜜

水炒瀉肝膽之火以猪膽汁拌炒去蘆用入東醫門寶鑑

柴胡 苦平微寒味薄氣升爲陽主陽氣下陷能引

清氣上行而平少陽厥陰之邪熱肝火時珍曰行少陽

黃芩爲佐行厥陰昂按人第知柴宣暢氣血散結調經胡能發表而不

知柴胡最能和裏故爲足少陽胆表藥府無出入其

經在半表半裏法當和解小柴胡湯之屬是也若病
 在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴
 胡則重虛其治傷寒邪熱仲景有大小
 表最宜詳慎柴胡等湯 痰熱結實虛
 勞肌熱冠宗與曰柴胡本經並無一字治勞藥性論
 時珍曰勞有五若勞在肝胆心包有熱則柴胡乃
 手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下
 陷則柴胡爲升清退熱必用之藥惟勞在肺腎者不
 可用耳冠氏一槩擯斥殊非通論昂按楊氏秦芄扶
 羸湯治肺痿成勞咳嗽聲啞體虛自汗 嘔吐心煩邪
 用柴胡爲君則肺勞亦有有用之者矣 嘔吐心煩邪
 半表半裏諸瘧寒熱東垣曰諸瘧以柴胡爲君佐以
 則多嘔吐嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪伏于半
 經慎用喻嘉言曰瘧發必有寒有熱蓋外邪伏于半
 表半裏適在少陽所主之界入與陰爭陽勝則熱出
 與陽爭陰勝則寒即純熱無寒爲瘧瘧純熱爲
 壯瘧要皆自少陽而造其極偏補偏救弊

方身通目

少陽之界使陰陽協和而後愈也謂少陽而兼他經則有之謂他經而不涉少陽則不成其為瘧矣脉縱屢遷而弦之一字實貫微之也昂按瘧之不離少陽猶效之不離于肺也談藪云張知閣久病瘧熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚孫琳投以小柴胡湯二服脫然琳曰此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈虧熱有在皮膚在藏府在骨髓在骨髓者非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減故三服乃効也時珍曰觀此則得用藥之妙的頭眩目赤矣昂據孫氏之說是柴胡亦能退骨蒸也頭眩目赤胸痞脇痛凡脇痛多是肝木之餘宜小柴胡湯加青皮川芎白芍又左脇痛宜活血行氣右脇痛宜消口苦耳聾皆肝胆婦人熱入血室即血室也食行痰口苦耳聾皆肝胆婦人熱入血室即血室也男女皆有之柴胡在胎前產後諸熱小兒痘疹五疳藏主血在經主氣胎前產後諸熱小兒痘疹五疳羸熱散十二經瘡疽血凝氣聚功同連翹連翹治血熱柴胡治

氣熱爲少異

陰虛火炎氣升者禁用

銀州者根長尺餘

微白治勞瘵良北產者如前胡而軟並良南產者強

硬不堪用外感生用肉傷升氣酒炒用根中及下降

用稍有汗效者蜜水炒前胡半夏爲使惡皂角

增訂本草

嬰備

柴胡稟仲春之氣兼地之辛味氣味俱輕升也爲少

陽經藥能引胃氣上行苦辛能散表熱之品也○在

仲景小柴胡湯治傷寒往來寒熱又治少陽經似瘧

非瘧○在大柴胡湯治傷寒表裏俱急○在東垣補

中益氣湯治元氣勞傷精神倦怠引脾胃之氣行陽
道○性升發散病屬虛而氣升者忌之嘔吐及陰虛
火熾炎上者法所同忌瘰癧非少陽經者勿用治瘰必
用柴胡其說誤甚不可久服按柴胡有二種色白黃
而大者爲銀柴胡以治勞熱骨蒸色微黑而細者以
解表發散本經無分別但云銀州者爲最則知其優
於升散而非除虛熱之藥明矣衍義所載甚詳故而
分之

本草經疏輯要

芫胡味苦平主心腹去腸胃中結氣

輕揚之藥能疎

飲食積聚疎腸胃寒熱邪氣之滯物驅經絡推陳致新總上三者

言之邪去久服輕身明目益精諸熱不能容則正氣流通故有此效○

芫胡腸胃之藥也觀經中所言治效皆主腸胃以其氣味輕清能于頑土中疎理滯氣故其功如此天下惟水能疎土前人皆指爲少陽之藥是知其末而未知其本也○張仲景小芫胡湯專治少陽以此爲主藥何也按傷寒傳經次第先太陽次陽明次少陽然則少陽雖在太陽陽明之間而傳經乃居陽明之後過陽明而後入少陽則少陽反在陽明之內也蓋以

所居之位言則少陽在太陽陽明之間以從入之道
 言則少陽在太陽陽明之內故治少陽與太陽絕不
 相干而與陽明爲近如小茈胡湯之半夏甘草皆陽
 明之藥也惟其然故氣味須輕清疎達而後邪能透
 土以出知此則仲景用柴胡之義明而茈胡爲腸胃
 之藥亦明矣

神農本草
經百種錄

地蕪 山茱 急就篇註茈胡一名地蕪一名山茱

按茈古柴字 芸蒿 茹茱 本草綱目柴胡嫩則

可茹老則搯而爲柴故有芸蒿茹茱之名 蘆頭豹

子 清異錄侯寧極藥譜蘆頭豹子柴胡也

事物異名錄

莼支濁才資切音慈急就章作柴胡之柴胡模濁洪

狽切音乎牛領下縣肉也

景字

莼才時切音慈本草柴胡作莼胡蘇恭曰莼古柴字

上林賦莼薑及爾雅莼草並作莼字此草根紫色今

大常用莼胡是也李時珍曰莼字有柴紫二音莼薑

莼草之莼音紫莼胡之莼音柴莼胡生山中嫩可茹

老采爲柴故苗有芸蒿山茱茹草之名而根名柴胡

也蘇說欠明古本張仲景傷寒論尚作莼字按李蘇

二說莼菜音義交溷不足信舊註引急就章莼作菜

胡之菜亦非胡

洪吾切音乎前胡菜胡藥名

正字通

增本草綱目

菜胡

菜舊作莼蘇恭曰莼古菜字

一名地薰一名芸

蒿一名山菜一名茹草

李時珍曰嫩則可茹老則采而爲菜故有芸蒿諸名而根

名菜胡也蘇頌曰關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲

勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉

而稍緊小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者

七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青

子與他處者不類其根似蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠

長者好李時珍曰銀州卽延安府神木縣所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也北地所產者亦如前胡而軟今人謂之北柴胡是也入藥亦良南土所產者不似前胡正如蒿根強硬不堪使用其苗有如蕻葉者竹葉者竹葉者爲勝其如邪蒿者最下也近時有一種根似桔梗沙參白色而大市人以僞充銀柴胡殊無氣味不可不辨氣味苦平無毒治心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣五勞七傷頭痛目昏耳鳴諸瘡婦人產前產後諸熱小兒痘疹時疾內外

熱不解單煮服之良彙考增戰國策今求柴胡桔梗

於沮澤則累世不得焉及之畢黍梁父之陰則却車

而載耳炮炙論柴胡出銀州銀縣西畔生處多有白

鶴綠鶴於此飛翔是茈胡香直上雲間若有過往聞

者皆氣爽也別錄增炮炙論凡求得銀州柴胡去鬚

及頭用銀刀削去赤薄皮少許以麤布拭淨剉用勿

令犯火立便無効

廣群芳譜

藥品 茈胡

卽柴胡

當塗縣志

柴胡 莖青紫葉形似竹葉香氣直透雲端時有鶴

翔集其上七月開黃花八月採收

含山縣志

茈胡

此品本草圖經雖不言出地道重修鎮地然皆境土所在故備錄之江府志

柴胡

始生宛句根長尺餘色白而軟俗呼銀柴胡

生北地者根狀如前胡而強硬如柴故名柴胡

畿輔通志

藥草

柴胡

松溪縣志

柴胡

古柴作茈圖經曰苗甚香莖青紫似竹葉稍

繁根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長

者佳

漳州府志
福建物產

柴胡

本草云苗引甚香莖青莖

味苦微寒

上林賦云茈

薑卽柴胡也鉤山縣志

莼唐韻將此切又鉏佳切音柴莼胡藥名急就篇註

莼胡一名地薰一名山茶通作柴杜甫詩書信有柴

胡胡唐韻戶孤切集韻韻會正韻洪孤切並音瑚說

文牛領垂也康熙字典

莼胡和名安末安加奈異名地薰本草山茶吳增補

異名芸蒿別錄茹草吳多識普編

莼胡ノゼリ又ノクサ藻鹽草

柴胡苦平微寒去蘊及鬚以水洗淨剉用勿令犯火

二二三

章宜云產銀夏者獨勝微白而軟者爲銀柴胡用以治勞弱骨蒸其說不同當更考之

本草
喉襟

柴胡 鍾倉柴胡與本草所記之形狀及自中華所來者相同コレヲ用ユベシ本邦ノ俗古來アヤマリテ雞腿兒ヲ用ヒテ河原柴胡ト稱ス形狀性味大異不可用可謂習矣而不察也舊習故陋ニ泥ムベカラス中夏ヨリ銀柴胡來ル鍾倉柴胡ヨリ大

也

大和
本草

茈胡柴同

地薰

芸蒿

山菜

茹草

和名

乃

世利 又云阿末安加奈 本綱柴胡二月生苗甚
香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小七月
開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青子與
他處者不類其苗有數品如竹葉者爲勝如韭葉者
次之如邪蒿者最下也 銀州之產長尺餘而微白
且軟不易得謂之銀柴胡爲最上銀州卽今延安府
神木縣 北地之產亦如前胡而軟入藥亦良謂之
北柴胡 南土之產不似前胡正如蒿根強硬不堪
使用近時有一種根似桔梗沙參白色而大以僞充

銀柴胡不可用

氣味

苦微寒
氣味輕

陽也升也手足少陽厥

陰四經藥也

行手足少陽以黃芩爲佐

行手足厥陰以黃連爲佐

在臟主血在

經主氣欲上升則用根以酒浸欲中及下降則用稍

治傷寒寒熱爲最要之藥傷寒外亦諸有熱則加

之無熱則不加也又能引胃氣上行又諸瘧以柴胡

爲君婦人產後血熱必用之

勿令犯火便無効
夏爲之使惡阜莢

畏半

女苑
藜蘆

△按柴胡倭亦有鐮倉河原之二種以鐮倉柴

胡爲最上唐人亦求之美稱

鐮倉柴胡根縮短長

者二寸許淡赤色本相州之產而今多出於武陽者

良日向薩摩肥後之產次之 河原柴胡根稍長四

五寸許紫赤色出_ル於豐州_ニ白水_{クスキヨリ}者良阿波備前安藝

紀伊能登佐渡越後次之但赤紫者爲上純紫者次

之淡_ワ白_キ者爲下_{倭漢三才圖會}

柴胡 宿根ヨリ春生ル莖ホソク葉ハ竹葉ノゴ

トク細長葉ノ間々ヨリ枝多ク出ル八九月黃花

サク草ダチハナモナガメアリ花檀ニウヘ鉢ニ

ウヘテヨシ_{廣益地錦抄}

柴胡 和名 アマナ 輟耕錄ニ蘆頭豹子ト云

本邦ニハ相州鎌倉ニ多ク有之初生ハ韭葉ノ如
ク地ニ就テ生ス八九月ニ至リ一莖ノ軸ヲ出ス
其上ニ苗香ノ花ノ如ク淡黄色子モ亦相同シ根
ハ舶來ノ物ト相同シ是ハ和産ヲ用テ佳也本草
花蒔

繪

柴胡釋名又作茈古字也中立曰狀如前胡強梗如

柴故名李挺曰茈水也胡系也以水代系相承也修

治米泔汁浸洗土氣去蘆頭及鬚削去赤薄皮少許

劉乾用忌火數曰用銀刀李挺曰忌銅鐵○按中華

稱銀柴胡者我邦鍾倉柴胡近之中華稱北柴胡者
我邦川原柴胡近之蓋葉形雖異而根樣卽同功能
亦何異哉凡解散用川原柴胡虛熱用鍾倉柴胡者
則是本汪石山記也氣味苦甘微寒無毒能入肝膽
二經半夏爲使主傷寒瘧疾寒熱往來嘔吐脇痛口
苦耳聾痰實結胸飲食積聚心中煩熱熱入血室目
赤頭疼濕痺水脹銀州柴胡理肝勞五疳羸熱用之
毒惡皂莢柴胡少陽經半表半裏之藥病在大陽者
服之太早則引賊入門病在陰經者復用柴胡則重

傷其表勞症惟在肝經者用銀柴胡若氣虛者不過
用些小助參耆非用柴胡退熱也若遇勞症便用柴
胡非所宜也修治唐和氏二可用但シ唐ハ藥陳^{フル}メ
性味又ケ用不足和ノ鍾倉柴胡ト云モノ真也可
用川原柴胡ト云モノハ翻白草ト云モノナリ又
雞腿兒トモ云柴胡ニ非ス本書ニ本草云北柴胡
ハ川原柴胡也ト云ハ誤リナリ南柴胡ト云^{ヤキ}圖
經ニアレ氏圖經ハ七百年ホド先ナレハ今ナク
テ昔アル所モアリ昔ナクシテ今アル^{ヤキ}モノアリ

何レヲ南トスルト云フハタイ川原柴胡ハ真ノ
柴胡ニ非ルヲ明ケシサレト性寒藥ニテ熱ヲ退
ケルニハ柴胡ノ能ニカハラヌヲモアルベシ補
中益氣湯や逍遙散ナドニハ不可用氣味苦平能
本言ノ如シ此藥少陽解表ノ藥ナリ清陽ノ氣ヲ
升セテ胃中留結宿滯ナカラシム陽氣下陷ノモ
ノニ可用鬱熱ヲ解スルハ香附子ヨリ勝リタル
モノナリ勞症ニ用ルヲアリ其勞肝膽心包絡ニ
アルモノニ用ユ勞肺腎ニアルモノニハ不可用

毒 本書ノ如シ先輩ノ説ニ柴胡ヲ勞症ニ用ル

ヲコトノ外ニ叱^{シカ}リテアレハ勞症ニ用井タルハ

銀柴胡ナリ銀柴胡ハ常ノ柴胡トハ各別ノモノ

ナリ色内外氏ニ同シ指ノフトサニテ六七寸モ

アリ常ノ柴胡トハ各別違フタモノゾ然レハ久

シク不來故藥肆ニアルモノコトノ外陳^{フル}シ若シ

新キ來ラバ可用虛勞ニ用テ大抵石斛ノ能ニ似

タルモノナリ小兒ノ疳勞ニ用ニ常ノ柴胡ハ毒

本書ニ云ガ如シ

片玉六
八本草！

芫胡試効療傷風寒時疫內外熱潮熱往來寒熱如
瘧狀諸熱肌熱婦人熱入血室瘧疾腸中停積口昏
赤痛障翳解血氣聚撰修凡撰芫胡以坊間呼鍾倉
芫胡狀如鼠尾淡赤黃色味苦者爲佳此乃韭菜芫
胡是也用時去蘆及鬚水洗剉細又有稱河濱芫胡
卽本草翻白草根世醫久慣用不能改正反爲之辭
曰此物亦能解熱此非實然乃文非之言耳不用可
也又有自華來貨銀芫胡是卽李時珍所謂近時有
一種根似桔梗沙參白色而大市人以僞充銀芫胡

殊無氣味者也又有ツル莢頭ツル莢胡ツル卽白頭翁根此二品

亦勿用之辨正按本草自陶弘景以下諸說頗違且

有銀莢胡北莢胡軟莢胡之別由今觀之終難歸一

姑用鎌倉莢胡爲適耳○神農本草作莢胡李時珍

曰古本傷寒論尚作莢字況月令莢薑爾雅莢草皆

從艸頭俱祖此切音紫後人以水代係相承誤作柴

胡醫家遂慣作豺音讀李時珍又曲爲說曰老則承

而爲柴皆誤矣故今改作莢字爲正大凡醫家音聲

大謬如李時珍註本草音讀柴用醫家俗呼作正音

皆然一本堂
藥選

柴胡 和漢共ニ可用但漢ハ多クハ陳舊ニシテ

蠱蛙多シ性味脱シテ不堪用鎌倉ト稱スルモノ

真ナリ可用又河原柴胡ト稱スルモノハ本草原

始ノ翻白草一名鷄腿兒ト云モノニシテ非柴胡

但和方久シク用來テ解熱ノ功ハ柴胡ニ彷彿ス

益氣湯等ノ補藥ニ升麻ト並用ルタグヒニハ決

ノ鎌倉ヲ可用河原柴胡ハ不唯無功而且有害慎

之ヲ
蘆頭豹子柴胡銀柴胡
銀州用藥
柴胡須知

柴胡 鍾倉柴胡ヲ真トス柴胡種類多シ赤熊柴
胡ハ白頭翁ナリ銀柴胡ハ茵陳ノルイナリ河原
柴胡ハ本草原始ノ翻白草ナリ又銀柴胡ハ唐ヨ
リモ來ル小兒ノ熱ヲ解スルニ甚佳ナリト云
會誌云河原柴胡本草原始ノ雞腿兒救荒本草ノ
委陵菜ナリ綱目ノ雞腿兒トハ別物ナリ今唐ヨ
リ來銀柴胡ハ疑ハ茵陳ノ根カ砂參ニ似タリ如
桔梗ト云ハ蒿ノ根ナルベシ葉邪蒿ノ如シト云
ハ福壽草カト云ヘリ 一説福壽草ハ雞腿兒ニ

近キモノナリ 別本ニ銀柴胡ト云ハカマクラ
サイコナリ川原柴胡ヲ防州ノ方言ニカチモン
チト云河原サイコヲ生ニテスリコメバ虱盡ク
成スト云又頭瘡ヲイヤスナリ 集解ノ福壽草
カト云ヘリ傷寒論集註白頭翁ノ條下柴胡中見
根下有白茸モノヲ爲真本草會誌

柴胡 藥肆ニ所鬻ノモノ三種アリ 一種ハ鎌倉
一種ハ川原一種赤熊此外更ニ無シ其鎌倉ト云
モノハ卽綱目ノ韭菜柴胡ナリ又近來一種大葉

ノモノヲ得根莖氣味全ク鎌倉ヲ用ヒ通用スベシ卽チ本草ノ竹葉柴胡ナリ先輩未タ大葉ノモノヲ見ズ綱目ノ集解ニ就テ韭葉竹葉ノ二名ヲ以テ一物トシ春時初生ノモノヲ韭葉トシ夏時長大ナルモノヲ竹葉トスト云ヘルハ誤ナリ分明ニ本是大葉小葉ノ二種アリ其大葉ノモノ藥肆ニコレヲ鬻カズ諸山多ク有之葉圓大似紫鶴仙葉テ薄シ高サ三尺細黃花ヲヒラク敗醬花ニ似テ細瑣花ト根ト全ク鎌倉柴胡ニ同ジタゞ大

小ノ異ノミソノ川原柴胡ハ本草原始ニ載スル
トコロノ翻白草ナリ近世大和本草等ノ書ニ綱
目ノ翻白草ヲ以テ之ニ充ハアヤマレリ綱目ノ
翻白草ハ時珍明ニ云其葉似地榆ト此モノ山中
ニ生ス一根數莖莖頭必ス三葉蛇莓葉ニ似テ長
大根ハ全ク雞腿兒ニ同シ綱目翻白草根ヲ雞腿
兒ト名ツク原始載トコロ翻白草名全ク同ジキ
ヲ以テ混雜シヤスシ宜ク辨別スベシソノ赤熊
柴胡ト称スルモノハ卽白頭翁ニメ柴胡ニアラ

本草 五 再タビ詳翻白之名川原柴胡葉背白ク風コ
レヲ翻ス時ハ幡々然タリ能ク翻白ノ名ニ應ズ
時珍説トコロ三葉ノモノハ葉背白カラズ形狀
又異ナリ翻白ノ名ニ應セズ唯根狀ハ一ナルノ
ミ然ル時ハ翻白草ハ原始載ルモノニノ其雞腿
兒者綱目載ルトコロ是ナリ然ソノ雞腿兒ハ
ニ物ニ通ズルノ名トノ可ナリ根ノ狀相似タル
ヲ以テ俱ニ雞腿兒ノ名アリ綱目翻白草ヲ以テ
雞腿兒ノ一名トスルモノハ誤ナリ如是辨別ノ

判然タリ然ノ其功柴胡ニ減セ人本邦醫家常ニ
用テ解熱ノ藥トス屢奇効ヲ得且レ亦日本ノ柴
胡ト称スベシ但補中益氣湯等升麻トナラベ用
テ升提ノ功アルガ如キハ鎌倉ニ非レバ能セズ
雞腿兒ノ如キハ此功ナシ方ニ從テ宜ヲ製シ並
行ハレテ恃ラザルベシ

本草一
家言

柴胡 其始鎌倉ヨリ出シトテ鎌倉サイコト称
セリ麥門冬葉竹葉若水翁一種トセリ先人云古
ヘ南柴胡ト云ヲ渡セリ熊ザ、ノ葉ノ如シコレ

竹葉也今和邦ニ多キハ麥門冬葉又萐葉ト云ベ
シ肥地ニ生ズルハヨホド大葉ニナルナリ備急
ニノスル丹州ノモノハ別ニ一種也凡四五種アリ
又ホタル草ト云モノヲ竹葉ノ柴胡トスルハ
誤也銀州モノハ別ナリ曩言ニ主治ヲ別トス海
舶ノモノハ前胡ノ類ナラン又斜蒿ニ似タリト
云ハ芸蒿ト云ヨリナリ我邦ニモ河原柴胡ト云
モノヲ以テ充ツモトヨリ柴胡ノ類ニアラズコ
レハ弘景ガ説ヨリ紛説起レリ辨別ニアリ時珍

ナド胡説ナリ

救荒本草臆斷

柴胡

アミアカナ

古名

ノゼリ

同上

今ハ通名

一名蘆頭豹子

輟耕錄

山芹

村家方

鎌倉柴胡真ナ

リ卽集解ニ竹葉韭葉ト云モノ是ナリ春未ダ莖

トウ

立ザル時地ニ叢生スル葉ハ細長シコレヲ韭葉

トシ莖タチテ後ハ葉短シ此ヲ竹葉トス二物ア

ルニ非ト炮炙全書ニ云リ然氏今國ニヨリテ潤

葉ノ者一種アリ是竹葉柴胡ナリ其尋常ノ者ハ

韭葉柴胡ナリ今ハ鎌倉ヨリ柴胡ヲ出サレ氏

本草通串

其初鎌倉ヨリ出セシ故ニ舊ニ仍テ今モ鎌倉柴
 胡ト稱ス今藥肆ニ鎌倉柴胡ト稱スル者偽雜多
 シ用ユルニ堪ズ ミシマ柴胡ト呼モノ佳ナリ
 柴胡京師四邊ニ産セズ勢州紀州中國四國九州
 其餘諸州ニ生ズ葉ハ麥門冬^{ヤブコウ}葉ニ似テ短クウス
 ク^{タテスガ}豎條多シ又稍濶クノ^{ナニキ}箬竹葉ニ似タル者アリ
 皆莖ニ紫條アリ秋ニ至テ長サ二三尺葉互生ス
 形漸ク短小ニナリ葉間ゴトニ枝又ヲ分チ小花
 ヲ開キ攢簇スルヲ^{セリ}芹ノ花ノ如ク黃色ニノ茴香

花ノ形ノ如シ實モ苗香ニ似テ小シ此實ヲニキ
テ生ジ易シ 又城州白川山ニ大葉ナル者一種
アリ大柴胡ト呼又ホタルサウ同名云葉最大
ニノ紫萼ヤボウシ葉ノ如ク長サ一尺餘濶サ二三寸秋ニ
至リ粗莖ヲ起シ高サ六七尺枝ノ末ゴトニ花ヲ
開ク花實亦相同クノ微大ナリ是集解ニ謂ユル
南柴胡ニノ最下品ナリ舶來ノ者ハ唐ノ筆防風
ノ形ノ如ク蘆頭ニ毛アリ今ハ稀ナリ和ハ單蘆
ニノ細長ク澀味ナキ者ヲ真トス今藥舗ニ鍾倉

本草通串

柴胡ト稱スルモノハ薩州肥後邊ヨリ出ス數蘆
 連生シ澀味アル者ヲ雜工是南柴胡根ニノ下品
 ナリ三島柴胡ト稱スル者ハ東國ヨリ出ス此ニ
 ハ單蘆ナル者多シ藥用ニ入ベシ 又舶來ニ銀
 柴胡ト呼者アリ根ノ形肥大ニノ皮皺バ三黃白
 色切バ内ニ黃紋アリ此ハ柴胡ニ非ズ卽李時珍
 根似桔梗沙參白色而大市人以僞充銀柴胡殊無
 氣味不可不辨ト云モノナリ然ノ今啞科ニ用テ
 熱シ解ス炮灸全書ニ李念莪勞ト疳證トヲ治ス

ルノ説ヲ引リ古方ニ銀柴胡ト云ハ卽銀州銀縣
ノ柴胡ニノ黒色ノ者ヲ指今ノ鍾倉柴胡也色ノ
白キヲ云ニ非ズ今ノ世ニ色ノ白キ者ヲ以テ銀
柴胡ト爲モノハ乃別ニ一種同名ナル者ニノ和
産詳ナラズ今和俗銀柴胡ト呼モノアリ別物ニ
ノ菜類ナリ 又河原柴胡ト呼モノアリナニンジン胡蘿蔔
葉ニ似テ背ニ白毛アリ故ニ ウラジロ氏云中
夏ニ至リ五出ノ黄花ヲ開ク根ハ皮赭黒色藥舗
ニ粗皮ヲ去テ乾シ貨庸醫誤用テ解邪ノ材トス

是菜類ニノ柴胡ノ類ニ非ズ卽救荒本草ノ委陵
菜一名翻白菜ニノ本草原始ノ翻白草一名雞腿根
ナリ又一種河原柴胡アリ此ニ三葉ナル者ト七
葉ナル者トアリ總ノ ブクレウサウト呼三葉
ナル者ハ倭名ミツバザイコ卽菜部ノ翻白草一
名湖雞腿一名鷄腿根是ナリ此七葉ナル者ヲ救
荒本草ニ雞腿兒一名翻白草ト云三葉七葉ノ二
品皆葉背ニ白毛アリ故ニ翻白草ノ名アリ今又
大葉ノ河原柴胡ト呼モノアリ葉七葉ノ方ニ同

クノ背ニ白毛ナシ是雞腿兒ノ類ナリ又三葉ノ
者ト形同クノ背ニ白毛ナキ者アリ亦ミツバザ
イコト呼是翻白草ノ類ナリ又白頭翁ゼガイサウニシヤ
グマザイコノ名アリ又徐長卿ニスミザイコ
ノ名アリ釋名芸蒿ハ藥胡ノ苗ナリ又芸香ト云
ハヘンルウダナリ又楓香モ芸香ト云 茺藺

ハ藺ノ嫩根ナリ本草綱目啓蒙

蘆頭コガ豹子シ
輟耕錄カマクラザイコ 諸州コレアリ園圃ニ

移シ栽ヘテ繁衍シヤスシ二月舊根ヨリ苗ヲ生

本草綱目

ズ根モトハ葉ハ長クシテ吉祥クシフシク蘭ニ類ス梢ハ葉ハ短クシ

テ貞ウ柯葉ノ如シミナ縦道タツスチアリ六七月ニ至テ萼トウ

ノ高サニ尺許葉間ニ枝ヲ抽ンデ梢ゴトニ碎小

黄花ヲ開ク蒨フナスフ傘蓋カサノ如シ形テ八月ウイキヤ珠

花ニ似テ小ナリ花下細實ヲ結ブ地新カウホシ子ニ類ス

十月ニ至テ熟ス下種シテ生シ易シ凡ソ柴胡ノ

名ヲ冒スルモノ一ニナラズ

獐牙菜

ルホタ

近道

諸山往々有リ之二月ニ嫩苗ワカバ生ズ葉牛尾シヲテ菜ニ似テ

柔ニシテ滑澤アリ根皮灰黒ウスクロシ色五月ニ碎ナル黄

花ヲ開ク^{ニラハ}韭葉ノ柴胡ノ如シ本草綱目二所謂竹
葉柴胡此ナリ^花彙

或問柴胡有數種何以爲良曰柴胡春抽莖甚香莖
青紫堅硬微有細線楞葉似竹葉而小開細黃花今
人呼鎌倉柴胡者是也本草云有如韭葉竹葉者以
竹葉者爲勝今之鎌倉柴胡但初生苗如韭後葉似
竹耳非有二種也其似邪蒿者市中名沙柴胡者卽
雞腿兒也又有名犂牛柴胡者卽白頭翁也俱與柴
胡迥不相類皆物之傳僞者不宜入劑又有銀柴胡

根似桔梗及沙參而大山人皆委採送之醫家常習
偽以充銀柴胡殊無氣味者也今試之根狀類沙參
而大皮皺色黃白肉有黃紋此乃秦艽歟不可不察
又按李念我云治勞與疴證乃銀州柴胡別爲一種
郭章宜云產銀夏者獨勝微白而軟者爲銀柴胡用
以治勞弱骨蒸其說不同使用者宜考之

草木
辨疑

地薰 サイコナリ ○ 芸蒿 サイコナリ ○ 山菜

サイコナリ ○ 茺薑

茹草ナリ

藥品手
引草

柴胡

和名ノゼリ一名土茺

周防

處々二生又鎌倉

柴胡紀伊上品日向薩摩次之方書ニ銀柴胡アリ
銀州ノ者卽カミクラ柴胡ナリ今市家ノ銀柴胡
ハ茵陳根ナリ用ベカラズ山城白川山ニ螢草ホタルササアリ
卽救荒ニ獐牙菜ト名ク此柴胡ニ近キ者ナリ
代用ベシシヤダミ柴胡ハ白頭翁ナリ鈴柴胡ハ
徐長卿ナリ俱ニ柴胡ニ非ズ柴胡苗汁柴胡ノ葉
莖ノシル千金方
藥註

柴胡 貝原氏松岡氏共ニ鎌倉柴胡ヲ真ナリ可
用ト云性味佳ナリ然レモ漢渡之物ニ比スレバ

輕虛ナリ又河原柴胡ヲ二氏共ニ誤ツテ雞腿兒
トス雞腿兒ハ萊部ニ出テ、ムガコ人參芹人參
ト稱スル物ナリ河原柴胡ハ救荒本草ノ委陵菜
ナリ其圖形狀可考但和方久シク用ヒ來レリ胡
黃連セシフリ藜蘆ヲモトノ如シ少々解熱ニ用
ユル可ナリ補藥等配劑ニハ決メ不可用本草
正譌

人蔘 菟胡 蔘說文人蔘藥草出上黨本草遂謂後世
因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然而前漢
史游急就篇遠志續斷參土瓜顏師古註參謂人參

丹參紫參玄參沙參苦參也又王符潜夫論云治病
當得人參反得羅服則本草之言不必矣芑爾雅玉
篇及上林賦皆爲紫草之紫也惟急就篇云黃芩茯苓
芩礬芑胡顏註芑古柴字而戰國策淳于髡曰今求
柴胡桔梗於沮澤則累世不得一焉世稱好古者特
用人芑芑胡字而以人參柴胡却爲後世之字且以
芑爲紫音可笑之甚也時珍云傷寒論尚作芑作芑
字攷宋板傷寒論猶作柴參今宋板趙清常所校必
非治平之舊但成無已本釋音芑音柴人芑下音參

本草綱目

則知古本如此

醫賸

柴胡

和名

カマクラサイコ

若水ノ
説ナリ

竹葉ニ

ンシン

ハイセンヲール

羅甸

ビユフレウリユ

ム

アウリクラレホリス

同上

和産ハ昔鎌倉ヨ

リ出ツ故ニ名ツク相刈尼寺カ原ニ多シ又武刈

駒場鼠山道灌山ニモアリ根味苦クシテ微シ甘

ク芳香也葉ハ麥門冬ニ似テ短叢生シ秋月高三

尺バカリ枝ヲ分チ小黄花アリ形苗香ニ似タリ

卽綱目集解頌説ノ麥門冬葉又竹葉ノモノ是也

一種大葉ノモノアリホタルサウト云蝦夷ニテ
 ホングト、云葉ハ玉簪ニ似テ狭ク花實力マク
 ラサイコト同シ葉根氣味相同シ一種尾州白山
 ノ産ハ形狀南柴胡ニ似テ苗葉氏ニ小一尺許四
 月花ヲ開ク又同ジ根土中ヲ延テ苗ヲ生ス澄玄
 曰古ヘ南柴胡ト云ヲ渡セリ然サ、ノ葉ノ如シ
 コレ竹葉ナリ中略備急ニノスル丹州ノモノハ別
 ニ一種ナリ又ホタルサウト竹葉柴胡頌説ノ竹葉ナルベ
 シトスルハ誤也銀州モノハ別ナリ本草彙言ニ

本草通串

主治ヲ別トス海船ノモノハ前胡ノ類ナラン云

云和蘭本草曰風化塩并油多シ清除シ創ヲ治ス

乾燥ス仁ハ蝮蛇咬ニ内服シテヨシ救荒本草通解

柴胡 一名山梨本草和名引雜要訣 蘆頭豹子輟耕錄 和

名ノセリ本草和名 ハマアカナ同上 シルミナリ東醫

寶鑑 蠻名ハイセンヲール羅甸 古來相州鎌倉ヨ

リ出スユヘカマクラサイコト名ク同州尼寺ケ

原下總州小金六方野武州駒場及鼠山等ニアリ

春宿根ヨリ生ス葉ハ大葉麥門冬ニ似テ短稍粉

綠色秋月莖高サ二三尺梢ニ枝ヲ分チ小ナル傘
狀ヲナシテ小黃花攢族ス小茴香ニ似タリ實ハ
防風子ノ如ク堅ニ條理アリ根黃黑色微香アリ
長サ三四寸ナリ蘇頌似麥門冬又竹葉ト云時珍
如韭葉ト云皆同物ニシテ是ナリコレ南柴胡ノ
一種ナリ一種大柴胡ト呼アリ蝦夷ニテホング
トウト云和俗ホタルサウ同名アリト云葉ハ車前葉
ニ似テ長シ秋月莖高サ三尺許其梢葉ハ竹葉ニ
似テ互生ス花ハカマクラサイコト同ジ根毛又

似テ短ク肥タリ大柴胡ノ一種尾州白山ニ産ス
 ルモノハ四五月花ヲ開キテ柴胡ノ如ク高サ一
 尺ニ過ズ根細ク蔓ヲ延テ根ノ至ル處ヨリ苗ヲ
 生スコレハ時珍ノ説ニ正如萬根強硬不堪用ト
 云是ナリ今藥店ニテ三島サイコト呼モノ藥用
 ニヨシ太田氏云備急本草ニ載ル丹州ノモノハ
 別ニ一種ナリ銀州ノモノハ別ナリ本草彙言ニ
 主治ヲ別トス舶來ノモノハ前胡ノ類ナラント
 云
 云 舶來ハ唐防風ノ如ク吳頭ニ毛アリ集解

ニ長サ一二尺ト云和産ハ一尺ニ過ズス陶弘景云

博物志云芸蒿葉似邪蒿

和名クジラグサ

ト云蘇恭云蒿

根ヲ以テコレトナス大ニ謬ト云弘景博物志ノ

芸蒿ヲ以テ柴胡トスルハ誤ナルベシ然ルヲ時

珍其邪蒿ニ似タルモノハ下品也ト云ハ弘景ノ

誤ヲ襲フナリ又本經ニ柴胡アリテ前胡ノ條ナ

キハ本經ニ用タル茈胡ハ今ノ前胡ナラン又前

胡ノ集解蘇頌ノ説ト博物志ニ説トコロノ柴胡

ト相似タリ又和俗ニカハラサイコト呼モノハ

救荒本草ノ委陵菜也ミツバサイコハ翻白草ナリシヤクハサイコハ白頭翁ナリスバサイコハ除長卿ナリ茈薑ノ嫩根ナリ本草
穿要

柴胡 古來相州鎌倉ヨリ掘出スユヘ鎌倉柴胡ト名ヅク下総小金武州駒場及鼠山等ニアリ春月苗ヲ生ズ大葉麥門冬ニ似テ短ク粉綠色莖高サ二三尺傘狀ヲナシテ小黃花開ク小苗香ニ似タリ實ハ防風子ノ如ク堅ニ條理アリ根黃黑色微香アリコレ北柴胡ナリ 一種ホタルサウ同名

リア處々山野ニアリ車前葉ニ似テ尖リ莖高サ三尺許花ハ前種ト同シ根短ク肥タレビ下品ニシテコレ南柴胡ナリ

一種

銀州柴胡備急ツルサイコ

水曾ノ白山ニ産スルモノ四五月份花アリテ柴胡ノ如ク黃色高サ一尺ニ過ズ根細ク蔓ノ如ク處處苗ヲ生ズ

本草圖譜

ア木ア力ナ柴胡和名鈔○ハ木ア力ナ柴胡本草和名○乃

セ利同上柴胡○ダイサイコ南柴胡柴胡集解本草藥名備考和訓鈔

柴胡 カマクラサイコ 葉石竹葉ノ如クニノコ

本草通串

ハシ枝多ク秋コマカナル黄花ヲ生ス又大葉ノ者竹葉柴胡ト云葉エビ子ノ葉ノ形ノ如花ハ力マクラト同集解ノ南柴胡ナリホタル草ト云花百

天工
區別

茈胡

戰國策作柴胡急就篇作茈胡通雅云唐本注云茈是台柴字竟作茈胡又證以相如賦

茈薑且云此根紫色不亦誣乎又有茈籬晉傳咸和刻令吏新立茈籬當讀爲柴此茈柴通借證也和

名鈔云安麻安加奈藻鹽草云野草播磨伊勢紀伊

肥後薩摩日向伊豆相模上總上野赤城出之近

官藥料從駿河上焉皆竹葉樣者而已精新紫實味

穰苦者好初春晚秋採者極良肆上所販多夏月採之故其性薄劣陳承云柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳東璧云有一種根似桔梗沙參白色而大市人以偽充銀柴胡古時舶來當此類又或以爲獐牙菜之屬不審從新云藥客入山收買將白頭翁丹參小前胡連志苗等俱雜在內謂之統柴胡斯方亦古雜售翻白草根云

本草綱目纂疏

增今鍾倉柴胡ト云モノハ薩州ヨリ出ヅ藥舖ニ

テ水口又寒掘或ハゾイエリデト呼ブ單蘆ニシ

テ肉厚ク緊實ソノ色黒ミアリ岐ナク細長ク三四寸ヨリ七八寸ニモ及ブ鼠尾ノ狀ノ如シ切口舶來ノ蒼朮ノ色ノ如シ甘氣アリテ油臭ナシ上品ノモノハ琉球表ニテ包三竹牌ニ野尼何某ト記シ來ル地名ト姓名ナリ又春ボリト呼ブモノアリソノ形短ク岐アリテ直ナラズ輕鬆ニシテ肉少ク心アリコレ掘り時ノ異ナルニ非ズ性味共ニ劣レリ寒ボリ春ボリヲ以テ呼モノハ薩州ノ產ナリ他州ノ產ニハ寒掘ノ稱ナシ豊後ヨリ

出ルモノハ根ニ岐アリテ直ナラズ岐アル者ヲ
藥戸ニテジヤグレデト呼ブ其形本口ノ春ボリ
ト云者ニ同ジ油氣アリテ病人服シガタシ下品
ナリコレヲ外口ト云或ハ剉ミテ本口ニ雜ユル
者アリ辨別スベシ又三島柴胡ハ細クノ單蘆ナ
リ淡赤色ニメ肉ニ黒キ心アリ本口ノ次トス房
州ヨリ出ルモノハ單蘆ニシテ微シク岐アリ三
島柴胡ヨリフトクシテ心ナクメ肉白シ或ハ三
島ノ別擇ト名ケ售ルコレモ外口ト云ソノ品三

島ニ次ク豊後ノ産ニ比スレバ油臭少ナシ 一
種白山ノ柴胡ト云モノアリ春舊根ヨリ苗ヲ生
ズ初生ノ葉ハ竹葉柴胡ニ似テ濶ク淡綠色ニシ
テ堅ニ數條アリ然レ真ノ柴胡ノ如ク紫條ニハ
アラズ夏月莖ヲ抽ク一ニ尺許葉莖ニ互生ス莖
ニツク葉ハ本濶クメ左右ヨリ莖ヲ抱ク脚葉ノ
本狹キニ異ナリ五月莖頂別ニ細葉ヲ分ツ一六
七枚各二寸許ニメ又四五分ノ細條ヲ攢生シ淡
黃色ノ細花ヲ開大サ一分ニ滿タズ後實ヲ結ブ

形蛇牀子ノ如シ根ハ白色ニノ鬚アリ秋後苗枯

ル重修本草
綱目啓蒙

サイコ カニクラ 柴胡 ○ ミルバサイコ ホタル 南

柴胡 ○ ヒロハサイコ アケボ 南柴胡 一種 物品 識名

柴胡 根 舶來ニ銀柴胡ト呼モノアリ其形肥大ニ

ノ皮皺ニ黃白色ナリコレハ時珍ノ説ニ根似桔

梗沙參白大市人以偽銀柴胡ト云モノニノ真ニ

アラズ 方書ニ銀柴胡ト云モノハ銀州ノ真物ハ

今渡ラズ 和産多シ藥舗ニ鐮倉柴胡及三島柴

胡ト呼モノ真ナリ鎌倉ト呼モノ今ハ薩州肥州等ヨリ出ヅ藥舗ニテハ鎌倉

ヲ上トシ三島ヲ次トスレバ枸ルベカラス河原柴胡ト呼モノハ救荒

本草ニ所載ノ委陵菜ニノ柴胡ノ類ニアラス和

方ニ往々コレヲ用ユ日用藥
品考

柴胡 アマアカナ古名 ノゼリ同上 今ハ通名

俗ニ鎌倉柴胡ト云者真ナリ本草云竹葉韭葉ト

云モノ是ナリ春未ダ蔓立サル時地ニ叢生スル

葉ハ細長シコレヲ韭葉トシ蔓ダテ後ハ葉短

シコレヲ竹葉トス二物アルニ非ズ炮炙全書云

初生苗如韭後葉似竹耳非有二種也 云 然レ氏

地ニヨリテ濶葉ノ者一種アリ是竹葉柴胡ナリ

尋常ノ者ハ韭葉柴胡ナリ今ハ鎌倉ヨリ柴胡ヲ

出サミレ氏其初鎌倉ヨリ出セシ故舊ニ仍テ今

モ名殘レリ秋ニ至リ梢ノ葉間ニ枝ヲ分チ小黃

花聚リ開ク苗香花ニ似テ實モ亦相似タリ根形

堅實ニシテ大サ箸ノ如ク長サ二三寸藥用トス

一種大葉者アリ ホタルサウト云葉形紫萼葉

ニ似テ小ナリ背ニ白粉ヲ帶ルガ如シ秋ニ至リ

本草綱目

莖ヲ抽ク高サ五六尺枝梢ニ花ヲ開ク花實俱ニ

柴胡ニ同シ是本草柴胡集解ニ謂ユル南柴胡ニ

ノ最下品ナリ餘ハ本草啓蒙ニ詳ナリ救荒本草啓蒙

柴胡

地蕪

山芳

銀柴胡ニ二種アリ

明和

年中渡ルモノ形大ニノ桔梗沙參ノ如シ真ニア

ラズ銀柴胡ハ銀州ニ生スル柴胡ナリ和産鎌倉

及三島等ヨリ出スハ野生ノモノニノ根白色ニ

ノ柔カナリ房州ヨリ出ルモノ根大ナレドモ下

品ナリ又根大ナルモノ南柴胡ニノ下品也薩州

日州ヨリ柴胡ヲ出ス海邊沙地ニ生スルユ工根
細長ニテ黒色乾ハ至テ硬ノ折ヤスシ下品ナリ

〔河原柴胡〕

雞腿根
翻白草

種類多シ救荒本草ノ委陵菜

ナリ又一種河原柴胡アリ此二三葉ト七葉トノ
二種アリ總ジテブクレウサウト云三葉ノモノ
ヲミツハサイコト云即チ萊ノ部ノ翻白草ナリ
七葉ノモノハ救荒本草ノ雞腿兒也又一名翻白
草ト云又一種大葉ノ河原柴胡アリ雞腿兒ノ類

ナリ
手板
發蒙

芫胡利氣禦表和裏

○古名ハナア力ナ
今通名ナリ

芫音柴

〔本經曰〕

芫胡味苦平主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱

邪氣推陳致新

〔案〕此草好生陽地其根經年不死氣

味苦辛芳散故善泄利結氣防表和裏以治往來寒

熱胸脇苦滿微煩瘕熱等

〔小柴胡湯〕

傷寒五六日

中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔

胸中煩而不嘔或渴

云

〔芫胡桂薑湯〕

傷寒五六

日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不

嘔但頭汗出往來寒熱心煩

〔撰品〕

芫胡有數品其稱

鎌倉ヲ樣者形如鼠尾皮赭黑色肉淡褐色出薩州日
州肥州等又稱三島デ樣者形瘠小皮赭色肉淡褐色
生豆州駿州遠州等並爲勝其他南方諸州皆有形
色各不同凡不拘根大小氣味苦芳發而無油臭者
可最用或味簽辛有油臭者不堪用又間有舶來形
味如鎌倉樣而肥大耳又有銀紫胡根形似沙參又
有加波良菰根形似菰紫黑是救荒委陵菜也此二種非真而藥
舖敗之則有誤用者矣又有南菰胡及雞腿兒皆根
形似菰胡故冒名耳○菰胡自秋生新苗其葉似瞿

麥青紫色至春漸長如竹葉秋岐數枝發小黃花結
細子至冬莖葉枯

古方藥
品考

本草通串

日本古典全集之内

編纂者

正

宗

敦

夫

東京市豊島區長崎町三丁目一六一

發行者

合資

會社 日本古典全集刊行會

代表社員

長 嶋

東 一

東京市豊島區長崎町三丁目一五八

印刷者

不二印刷所

高瀬 清吉

東京市豊島區長崎町三丁目一六二

發行所


合資

會社 日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十四年二月九日印刷
昭和十四年一月十三日發行

【非賣品】






UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4744

RS
180
J3S8
1937
v.10

